

소롱정 (소정룡탕)

【원료약품 및 그분량】 1정 중

마황(KP)	500mg	작약(KP)	500mg
간강(KP)	500mg	감초(KP)	500mg
개지(생규)	500mg	세신(KP)	500mg
오미지(KP)	500mg	반하(KP)	1000mg

이성물건조엑스 635mg

【성 상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 기관지염, 기관지천식, 콧물, 묽은 가래를 수반하는 기침, 비염(코염)

【용법·용량】 보통 성인 1회 2정, 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 병후의 쇠약, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 고혈압 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 고령자노인(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감항하는 등 주의할 것.)
 - 심장에 환자질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 신장에(신장장애) 환자질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 부종(부기) 환자
 - 지금까지 이 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 사람
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.)
 - 땀이 많이 나는 환자(땀 과다, 전신무력감 등이 나타날 수 있다.)
 - 간상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 폐노장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 당뇨병 환자(마페드린 류에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위일도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고압), 부종(부기), 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - 근경직(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근경직(근육병증)이 나타날 수

있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

- 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등
- 소화기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등
- 간장애 : 전신 권태감, 황달(피부 또는 눈의 황색이 위가 황색으로 됨) 등
- 간질성 폐렴 : 기침을 수반한 숨참, 호흡곤란, 발열 등
- 비뇨기계 : 배뇨장애
- 정신신경계 : 불면, 망 과다, 빠른맥, 오심을 자주 느낌, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
- 2) 개월간 콧물, 묽은 답을 수반하는 기침에 복용할 때에는 5~6일정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우.
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 칼륨함유제제, 간소함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로로메타이드)와 병용(함께 복용)시 위일도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
 - 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 같은 생약의 중복에 주의할 것.
 - 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 간상선제제(티록신, 리오치오닌), 카테콜아민제제(에파드린, 이소도라날린), 크산틴류제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용)시 불면, 망 과다, 빠른맥, 오심을 자주 느낌, 두근거림, 전신 무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감항하는 등 신중히 복용할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용후 반드시 밀폐 보관할 것.)
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 10정, 300정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【소비자상담실】 080-597-1020

문서개정일 :

* 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 자세한 약품정보를 원하시 식품의약품안전처 "이치드릭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)의 약품 정보" 를 참조하십시오 바랍니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 남동로 318번지
www.i-pharm.kr

공동개발
KOTMIN
한국한방산업진흥원

