

리스토액

Resto sol.

올바른 의약품 사용을 위하여 복용전 본 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

- 원료 약품의 분량 : 20 mL 중
시트룰린말산염(별규) 1.0 g
- 성 상
오렌지 향이 있는 무색내지 옅은 황색의 액
- 효능 · 효과
기능 무력증의 보조치료
- 용법 · 용량
성인 : 시트룰린말산염으로서 1회 1g, 1일 3회 복용한다.
소아(6세이상) : 시트룰린말산염으로서 1회 1g, 1일 2회 복용한다. 단, 4주 이상 투여하지 않는다.
- 사용상의 주의사항
 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
6세 미만의 유아
 2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것, 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 임부(동물실험에서 기형발생은 보고되지 않았으며 임상에서도 기형발생 또는 태자독성이 보고된 바 없으나 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임신 중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 수유부(유즙 분비에 대한 자료가 없으므로 이 약은 수유부에게 투여하지 않는 것이 바람직하다.)
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항.
 - 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것.
 - 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.
 - 3) 드물게 투여초기에 약한 위장관 장애가 나타날 수 있다.
 4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
- 포장단위 : 1포(20mL) x 자사포장단위
- 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- 사용기한 : 제조일로부터 36개월
- 제조원 : 셀티스팜(주) 충북 충주시 대소원면 첨단산업1로 120

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 유통과정 중 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화 (043-845-8841) 로 하시기 바랍니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→「정보마당」→「의약품등 정보」를 참조하세요.

※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 마십시오.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.



충청북도 충주시 대소원면 첨단산업1로 120
(소비자 상담실: 043-845-8841)

개정연월일 : 2014. 01. 16