

위큐® 정

분류번호 : 소화성궤양용제(232)

【원료약품 및 그 분량】

이 약 1정(730.0mg) 중,	
라니티딘염산염(라니티딘으로서 75mg) (USP)	84.0밀리그램
비스무트트리스염칼륨(산화비스무트로서 40.5mg, 칼륨으로서 12mg) (KP)	100.0밀리그램
수크랄레이트수화물(당옥티올레이트로서 102mg) (USP)	300.0밀리그램

【성상】 희색의 원형 평육코팅제로서, 희색의 원형 평육코팅제를 함유한 유백제

	임	위
정신장애	○ YH O	○

【생물·화학】

원래임, 위원, 심지어장제임, 풀링가임리슨, 정후근, 역류성 식도염, 마취전 투약(연결수 정후근 역임), 수습후 계장, 비스테로이드성 소염진통제(NSAID)로 인한 위·십이지장질환

【음향·음향】

- [illegible]

【사용상의 주의사항】

4. 다음 문장에는 투어하지 마십시오.
- ㉠ 투석요법을 받고 있는 환자
 - ㉡ 리나리니관혈종에 대해 가만앉고 기왕력이 있는 환자
5. 다음의 경우에는 산통의 투어하십시오.
- ㉠ 산통과 함께 한새출렁증상 지속되고 투여량을 감소하거나 투여간격을 두고 사용
 - ㉡ 다량배가 있는 환자
 - ㉢ 약제내면층의 경락이 있는 환자
 - ㉣ 골경직
6. 투석은:
- ㉠ 드물게 속이 나탈증 수 있으므로 이 약을 투여할전 환자는 주의있게 관찰하고 만약 이러한 증상이 나타난 경우 투석 부위를 교체하고 즉시 치료를 해야 합니다.
 - ㉡ 골경직을 유발시킬 수 있지만 혈당신박증으로 인한 기침기결함, 자발한 동맥 경색이나 내달 수 있습니다. 이러한 증상이 나타난 경우에는 투석 중단 후 투석기를 제거합니다.

여론 중지합니다

- [illegible]

4. 일반적 주의사항

- 2) 장기연용을 하지 않습니다.

5. 임부 수유부와의 투여

- 2) 교육청으로부터 이해회보로 투영을 수반하지 않기로 수동해; 합니다.

6. 소아 투여

- 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다.)

7. 임상검사치에 대한 영향

시험지법에 의한 노단백검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 Sulfosalicylic acid로 실험하는 것이 바람직합니다.

8. 과장투여

- 기타
- 1) 위약의 중상을 문제삼아 있으므로 과실이 아닌 것을 확인하여 두어함;
- 2) 돌출의 흡수 배설상에서 안과내과적 진찰상이 있다는 보고이므로 참가하면서 안과적 검사를 행하는 등 주의를 두어함;

【저장방법】 기밀용기 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30점 300점

【사용기법】 외부포장용기에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

- ※ 본 의약품은 GMP업소에서 제조되어 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드려야 하며, 상부의 '소비자안전성예외기준'에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 취급 변경된 내용은 홈페이지(www.yuhan.co.kr) 또는 소비자 상담실(080-024-1188)에서 확인하실 수 있습니다.

문안작성년월일 2014. 12. 3
 11501-01



제조의뢰판매원

유한양행

본사 : 서울시 동작구 노량진로 74
공장 : 충청남도 청주시 청원구 오송읍 연구자로 78

www.yuhan.co.kr

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

제조의 하올바이오파마(주)

공장 : 대전광역시 대덕구 상서동