

뇌혈관 질환 실버세린정

(콜린알포세레이트)

Silverserine Tab.

실버세린정의 성분인 콜린알포세레이트는 BBB(Blood-brain barrier)를 통과해 콜린(Choline)과 글리세로포스페이트(glycerophosphate)로 분리됩니다. 이후 Choline은 아세틸콜린이 되어 뇌기능을 유지시키고 glycerophosphate는 자체가 Cell membrane 성분이며서 손상된 뇌세포를 회복시킬 수 있습니다. 즉, Glycerophosphate는 세포막 인지질의 전구체로, 손상된 신경세포막을 복구하여 세포기능을 정상화시킴으로써 노화와 뇌혈관질환에 의한 뇌기능 장애 치료에 도움을 줄 수 있습니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

콜린알포세레이트(KPC) 400mg

첨가제(동물유래) : 우당수화물 (기원물질 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 황색 4호 알루미눔레이크, 적색 40호 알루미눔레이크

성 상 당형색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 뇌혈관 질환으로 인한 2차 증상 및 변성 또는 퇴행성 뇌기질성 정신증후군 : 기억력저하와 착란, 의욕 및 자발성저하로 인한 방향감각장애, 의욕 및 자발성 저하, 집중력감소
2. 감정 및 행동변화 : 정서불안, 자각과민성, 주위무관심
3. 노인성 가성우울증

【용법·용량】

콜린알포세레이트로서 1회 400mg을 1일 2~3회 경구투여한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약은 황색 4하타르타르산을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 이상반응
 - 1) 2차적인 도파민 작용에 기인한다고 추정되는 구역이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 투여한다.
 - 2) 소화기계 : 위염, 위질한
 - 3) 정신신경계 : 졸음, 불면, 작게심, 신경질, 경련, 운동과다
4. 보관 및 취급상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실(☎031-377-7909)로 문의하시기 바랍니다.

본 제품은 인산성이 있으므로 PTP포장상태로 보관 및 조제하시고, 복용할 때 개봉하십시오.



한국휴텍스제약(주)

경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제조의뢰자 : 한국휴텍스제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 99

제 조 자 : 한국프라마제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

설명서 작성일 : 141006

