

진해·거담제

투윈에취® 시럽

ToWinH® Syrup

■ 성분·함량 : 이 약 1포 (20mL) 중

디히드로코데인타르타르산염(USP)	10mg
d-메틸에페드린염산염(KP)	26.2mg
클로르페니라민말레산염(KP)	3mg
염화암모늄(USP)	200mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	1.6mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	0.4mg
첨가제(타르색소) : 적색 40호	

■ 성상 : 옅은 빨강색의 방향성 시럽제**■ 효능·효과** : 기침, 가래**■ 용법·용량** : 다음 용량을 1일 3 ~ 4회 식후 및 취침시 복용합니다.

- 성인 : 1회 20mL
- 11세 ~ 14세 : 1회 13mL
- 8세 ~ 10세 : 1회 10mL
- 5세 ~ 7세 : 1회 7mL
- 3세 ~ 4세 : 1회 5mL
- 1세 ~ 2세 : 1회 4mL
- 3개월 이상 ~ 1세 미만 : 1회 2mL

■ 사용상의 주의사항**1. 다음 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.**

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 3) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병 등 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 심장에 장애가 있는 사람, 혈압이 높은 사람 또는 고령자
- 5) 임부 또는 임신하고 있다고 생각되는 부인, 수유부
- 6) 의사의 치료를 받고 있는 사람

2. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 다음 약들과 동시에 복용하지 마십시오.(다른 진해거담약, 감기약, 항히스타민제, 진정제 등)
- 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도, 감독하에 복용시키십시오.
- 4) 7세 이하의 소아는 시럽제를 복용시키십시오.
- 5) 3개월 미만의 유아에게는 복용을 피하고, 3개월 이상도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는게 좋습니다.

3. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피하십시오.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.

4. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지마십시오.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

■ **포장단위** : 20mL

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우, 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(drugsafe.or.kr→의약품 유행사례보고)에 알리시기 바랍니다.

※ 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(파우치, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

※ 이 약은 의사 또는 치과의사의 처방에 의하여 복용할 수 있는 전문의약품입니다. 이 약의 올바른 복용법을 모르시거나 이 약 및 질병에 대한 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

“이 첨부문서 개정일(14년 10월)이후 변경된 내용은 www.kdpharma.co.kr나 02-576-6121,3에서 확인할 수 있으며, 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.”

제조의뢰 · 판매원 : 경동제약(주)

경기도 화성시 양감면 제약단지로 224-3

소비자 상담실 전화번호 : (02) 576-6121,3

제조원 : 한국콜마(주)

세종특별자치시 전의면 산단길 245

