

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의감게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품
분류번호 319
KGP 직접제

고함량 콘드로이틴 600mg + 활성비타민B 복합제

빅콘에스600[®]

원료약품 및 그 분량 1정 중

감마오리자놀(KPC)	5 mg
쿠르실티아민(KPC)	60 mg
니코틴산아미드(KP)	60 mg
폴린타르트로산염(USP)	20 mg
판토텐산칼슘 (KP)	15 mg
(칼슘으로서 1.2 mg)	
리보플라빈부티레이트(KP)	6 mg
이노시톨(KP)	20 mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KPC) (기원동물 : 소, 사용부위 : 연골)	600 mg
피리독신염산염(KP)	25 mg
시아노코발라민1000배산(KPC)	20 mg
(시아노코발라민으로서 20 µg)	
첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)	

성상

갈색의 장방형 필름코팅정

효능·효과

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆ 의 보급
- 육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절염(요통, 어깨결림 등)
 - 각기, 눈의피로

용법·용량

12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 고칼슘혈증(hypercalciemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (3) 신장(콩팥)결석 환자
- (4) 심한 증상의 신부전 환자
- (5) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- (3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장(콩팥)장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 강심배당체를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴말아오름, 심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴·다리 종창(부기)
- (2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- (4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 유헤림부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- (7) 항알도스테론제, 트리탄데렌과 병용투여(함께 복용)시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위

45정

취급상의 주의사항

- ※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서 작성일자(2014년 10월 27일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 소비자 상담실(02)561-4011

- 제조의뢰자 : 슈넬생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16
- 제조자 : (주)마더스제약 / 경북 경산시 진량읍 공단6로24길 18
- 판매자 : (주)대웅생명과학 / 서울시 강동구 강동대로 189