

소화기능조절제

트리멘 정(트리메부틴말레산염)

Trimebutine Maleate 150mg

SI12026-00

일반 의약품

분류번호 239

【성분·함량】1정 중

트리메부틴말레산염(KP) 150mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소, 우유), 젤라틴(소, 가축내피)

【성상】

흰색의 원형정제

【효능·효과】

1. 주요능·효과

- 1) 식도역류 및 열공헤르니아, 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통, 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애 (변비, 설사), 동요자극, 수면장애

【용법·용량】

성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여 한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 부작용

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 구갈, 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장: 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증: 드물게 발진등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

3. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30, 1000정

【제조의뢰자】 (주)이든파마 충북 진천군 문백면 농다리로 1149

【제조자】 (주)넥스팜코리아 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-41

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 하였거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의는 전화(02)3487-7005로 하시기 바랍니다.

※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색' 에서 확인할 수 있습니다.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다.

개정연월일 : 2015년 02월 26일