

유코틸 캡슐

(아세틸시스테인)

■ 성분 및 분량 : 1 정 중

아세틸시스테인(USP)..... 200mg
첨가제(동물유래) : 유당수화물

■ 성 상 : 흰색의 분말이 든 상 · 하부 흰색의 캡슐제

■ 효능 · 효과

1. 주효능 효과

- 1) 다음 질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 낭성섬유증
- 2) 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이염

■ 용법 · 용량

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 경구 투여합니다.

1. 급성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 3회
- 소아 : 6-14세 1회 200mg 1일 2회

2. 만성질환

- 성인 : 1회 200mg 1일 2회
- 소아 : 6-14세 1회 100mg 1일 3회

3. 낭성섬유증

- 소아 : 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2-5세 1회 100mg 1일 4회
- 연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에는 투여하지 말 것.

- 1일 허용량제한 :

아스파탐 함량을 WHO권장량(40mg/kg/1일)이하로 조정(가능한한 최소량 사용)할 것.

60kg 성인 : 1일 최대복용량 2.4g

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 위 · 십이지장궤양 환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않습니다.)

4. 부작용

- 1) 소화기계 : 드물게 구역, 구토, 구내염, 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 2) 과민증 : 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명, 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 드물게 빈맥, 고혈압이 나타날 수 있습니다.

5. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여합니다).

6. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여합니다.

7. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여합니다.

8. 적용상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

■ **사용(유효)기간** : 제조일로부터 24개월

■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

■ **포장단위** : 자사포장단위

■ **제조사** : (주)씨엠지제약, 경기도 시흥시 공단1대로 27번길 27

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기한을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변폐 또는 오손된 제품을 구입 했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다. (소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 이지드럭(ezdrug.kfda.go.kr) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 www.globalpharm.co.kr의 각 제품 란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

----- 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다. -----

작성일자 2014년10월 14일

제조의뢰자



(주)한국글로벌제약

www.globalpharm.co.kr

충남 서천군 종천면 종천공단32번길 26