

피나텐정5mg(피나스테리드)

※ 의약품용 사용하기 전에 본 문서를 자세히 읽어보시고 의약품과 함께 보관하십시오.
[원료약품 및 그 분량] 1정 중
피나스테리드(USP) 5밀리그램
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
첨가제(타르색소) : 청색1호, 적색3호
첨가제 : 라우릴황산나트륨, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘,
전분글리콜산나트륨, 탭크, 화화전분, 히프로멜로오스

[성 상] 파란색 사과모양의 필름코팅정

[효능 · 효과]
양성전립샘비대증 : 양성전립샘비대증 증상의 개선, 비후된 전립샘의 퇴행 및 요류 개선,
급성 요폐의 발생빈도 감소, 전립샘 경요도 절제술(Transurethral Resection of the Prostate)
및 전립샘 절제수술 등을 포함한 수술의 필요성 감소

[용법 · 용량]
피나스테리드로서 1일 1회 5 mg을 식사와 관계없이 경구투여합니다. 복용 시 증상이 개
선 되더라도 최소 6개월간의 치료가 필요합니다.
· 신부전 환자 : 약물동력학적으로 볼 때 이 약의 투여 시 어떤 변화도 없었으므로 여러
종류의 신부전 환자(크레아티닌청소율 : 9.0 mL/min)에게 용량 조절할 필요가 없습니다.
· 고령자 : 70세 이상 고령자에게 있어 이 약의 배설이 약간 감소되기는 하나 용량을 조
절할 필요는 없습니다.

[사용상주의사항]

1. 경고
1) 이 약은 소아 또는 여성에게 투여하지 않습니다.
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성은 피나스테리드의 흡수 및 그 이후 남
성 태아에 대한 잠재적 위험의 가능성이 있으므로 이 약의 부서지거나 깨진 조각을 만
져서는 안 됩니다. 이 약은 코팅되어 있기 때문에, 깨지거나 부서지지 않았다면 정상적
인 취급 시에는 활성 성분과의 접촉을 방지할 수 있습니다.
3) 기분변형과 우울증
피나스테리드 5mg을 투여한 환자에서 우울한 기분, 우울증이 보고되었고, 이보다는 적은
건수로 자살생각을 포함한 기분변형이 보고되었습니다. 정신학적 증상에 대해 환자를
관찰하고, 만약 환자에게 이러한 증상이 발생하는 경우 의료전문가에게 상담하도록 해야
합니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 환자 2) 여성 또는 소아
3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
4) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토로스불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡
수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여
하면 안 됩니다.
3. 다음 환자에는 신중히 투여해야 합니다.
간 기능에 이상이 있는 환자

4. 이상반응
1) 이 약은 내약성이 우수하고 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이었습니다.
2) 외국의 임상
4년간의 위약대조 임상시험(PLESS, Proscar Long-Term Efficacy and Safety Study)에
서 이 약으로 치료를 받은 1,524명의 환자와 위약 치료를 받은 1,516명의 환자에 대한
4년에 걸친 안전성 평가를 실시하였습니다. 이 약으로 치료한 3.7 %(57명의 환자), 위약
으로 치료한 2.1 %(32명의 환자)가 성기능관련 이상반응으로 치료를 중단하였으며, 가
장 빈번하게 보고된 이상반응은 성기능관련 이상반응이었습니다. 4년간의 임상시험에서
위약보다 높은 빈도로 발현하였고 이 약에서의 발현율이 1 % 이상이었으며 임상시험연
구자에 의해 약물과 관련되어 있을 가능성이 있거나, 아마도 관련되어 있거나, 분명히
관련되어 있다고 간주된 이상반응은 다음 표와 같습니다. 임상시험 2 ~ 4년에서는
투여군간 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애 발현율에 유의한 차이가 없었습니다.
표1. 약물관련 이상반응

분류번호 : 02590 0520102
Finaten Tab. 5mg KGMP 전문의약품

	1년(%)		2 ~ 4년(%)	
	이 약(n=1,524)	위 약(n=1,516)	이 약(n=1,524)	위 약(n=1,516)
발기부전	8.1	3.7	5.1	5.1
성욕감퇴	6.4	3.4	2.6	2.6
사정액감소	3.7	0.8	1.5	0.5
사정장애	0.8	0.1	0.2	0.1
유방비대	0.5	0.1	1.8	1.1
유방압통	0.4	0.1	0.7	0.3
발진	0.5	0.2	0.5	0.1

3) 장기사용에 관한 자료
3,047명의 환자를 대상으로 4 ~ 6년간 수행한 위약 및 양성대조 임상시험에서, 이 약 5 mg
을 투여한 투여군에서 4건의 유방암이 발생하였고, 위약군 및 양성대조군에서는 발생하지 않
았습니다. 별도의 3,040명의 환자를 대상으로 4년간 수행한 위약대조 임상시험에서 위약군에
서 2건의 유방암이 발생하였고 이 약 5 mg 투여군에서는 발생하지 않았습니다. 18,882명의
남성이 참여한 7년간의 위약대조임상시험(Prostate Cancer Prevention Trial, PCPT)에서 이
약 투여군 및 위약군에서 각각 1건의 유방암이 발생하였습니다. 남성 유방암에 대한 시판 후
보고가 있습니다. 이 약의 장기간 투여와 남성유방 신생물간의 관련성은 현재 알려져 있지
않습니다.
PCPT 임상시험은 직장수지검사서 정상이고 전립선 특이항원(Prostate Specific Antigen,
PSA) 수치가 ≤3.0 ng/mL인 55세 이상 18,882명의 남성이 참여한 7년간의 무작위, 이중맹검,
위약대조 임상시험이었습니다. 남성들은 이 약 5 mg 또는 위약을 1일 1회 투여받았습니다.
환자들은 매해 직장수지검사 및 PSA를 평가받았으며, 생체조직검사는 PSA가 상승되거나 직
장수지검사서 비정상적으로 나온 경우와 임상시험 마지막에 시행되었습니다. 위약을 투여받은
남성(1.1 %)에 비해 이 약을 투여받은 남성(1.8 %)에서 Gleason 등급 8 ~ 10의 전립샘암의
발생빈도가 더 높았습니다. 다른 5α-환원효소 억제제(두타스테리드)에 대한 4년간의 위약대
조 임상시험에서도 Gleason등급 8 ~ 10의 전립샘암에 대한 유사한 결과가 관찰되었습니다
(1 % 두타스테리드 vs. 위약 0.5 %). 이 약 5 mg을 투여받은 전립샘암 환자에서의 임상적
유익성은 입증되지 않았습니다.
4) 외국의 시판 후 조사

이 약 그리고/또는 이 약 복용량에서 다음과 같은 이상반응이 추가로 보고되었습니다. 이 이
상반응은 불특정 인구집단에서 자발적으로 보고된 것이기 때문에, 발생빈도를 신뢰성 있게
예측하거나 약물노출과의 인과관계를 확립하는 것은 일반적으로 가능하지 않습니다.
(1) 면역계 : 가려움, 두드러기 및 혈관부종(입술, 혀, 목구멍 및 얼굴의 종창을 포함)과 같은
과민반응
(2) 정신계 : 우울증, 투여 중단 후 지속되는 성욕감퇴
(3) 생식계 및 유방 : 고환통; 투여 중단 후 지속되는 성기능 장애(발기부전, 사정장애) ;
남성 불임 그리고/또는 정액의 질 저하, 피나스테리드 투여 중단 후
정액의 질 정상화 혹은 개선이 보고되었다. ; 남성 유방암
(4) 위장장애(속쓰림), 어지럼, 두통
5) 국내의 시판 후 조사
6년동안 3,675명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 이상반응의 발현빈도율은 인과관계와
상관없이 107명에서 124건(3.37 %)이 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있을 수 있는 것
으로 평가된 것은 위장장애(속쓰림), 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량 감소), 발진, 가려움,
과민반응, 두통, 어지럼이었습니다.
(1) 소화기계 : 소화불량, 변비, 위장장애(속쓰림), 목마름 등 7건(0.19 %)
(2) 비뇨생식기계 : 발기부전, 성욕감퇴, 사정장애(정액량감소) 등 102건(2.78 %)
(3) 피부 : 발진, 가려움증 등 2건(0.05 %)
(4) 전신 : 양손저림, 과민반응, 두통, 권태감 등 6건(0.16 %)
(5) 기타 : 어지럼, 중이염, 간기능 이상 등 7건(0.19 %)

5. 일반적 주의
1) 이 약에 의한 약효는 즉시 명백하게 나타나지 않으므로 다량의 잔류뇨를 가지는 환자나 심
각하게 요속에 감소한 환자는 장애적인 요로질환에 대해 주의깊게 검사받아야 합니다.
2) 의사는 이 약으로 치료를 시작하기에 앞서 감염, 전립샘암, 협착 질환, 저장성 방광 또는 양
성전립샘비대증(BPH)과 유사한 다른 신경질환을 확인하기 위한 적절한 평가를 실시해야 하며,
환자에게 제품설명서를 읽어보도록 지도하고 처방을 갱신할 때마다 한 번 더 읽어보도록 하
여 환자들이 이 약과 관련된 최신 정보를 인식하도록 합니다.

3) 의사는 이 약으로 치료하는 동안 일부 환자에서 사정액이 감소할 수 있다는 것을 환자에게
알려야 합니다. 이런 사정액 감소가 정상적인 성기능을 방해하는 것으로 보이지는 않지만 이
약으로 치료를 받는 환자에게 발기부전과 성욕감퇴가 발생할 수도 있습니다.
4) 직장수지검사서 정상이고 PSA 수치가 ≤ 3.0 ng/mL인 55세 이상의 남성을 대상으로 7
년간 이 약 1일 5 mg을 복용한 PCPT 임상시험에서 Gleason 등급 8 ~ 10의 전립샘암 위험
성이 증가되었습니다(피나스테리드 1.8 % vs. 위약 1.1 %). 다른 5α-환원효소 억제제(두타스
테리드)(1 % 두타스테리드 vs. 0.5 % 위약)에 대한 4년간의 위약대조 임상시험에서도 비슷한
결과가 관찰되었습니다. 5α-환원효소 억제제는 고등급 전립샘암 발전의 위험성을 증가시킬
수 있으나, 전립샘 부피를 감소시키기 위한 5α-환원효소 억제제 효과 때문인지, 이러한 연
구들의 결과에 영향을 미치는 다른 요인들 때문인지는 확립되지 않았습니다.
6. 상호작용
1) 이 약과 관련된 약물상호작용은 알려진 바 없습니다.
2) 이 약은 CYP-450 관련 약물대사효소계에는 영향을 끼치지 않으므로 이러한 기전으로
대사되는 약물인 프로프라놀롤, 디곡신, 글리브리드, 와르파린, 테오피린, 안티피린 등과
의 상호작용은 나타나지 않습니다.
3) ACE억제제, 알파차단제, 베타차단제, 칼슘채널차단제, 심장성질산염제, 이노제, H2길
항제, HMG CoA환원효소억제제, 비스테로이드성소염진통제(NSAIDs), 퀴놀론제, 벤조디
아제핀 등과 병용투여시 임상적으로 유의한 이상반응은 나타나지 않습니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 이 약은 임부나 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 투여를 금합니다. 이 약을 임
부가 복용 시 남성태아의 외부생식기의 비정상성을 초래할 수 있습니다(II형5α-환원효
소 억제제가 테스토스테론이 디하이드로테스토스테론으로 전환되는 것을 저해한다).
만일 이 약을 임신 중에 복용했거나 또는 이 약을 복용하는 도중에 임신이 되면 임신
여성에게 남성태아에 대한 잠재적 위험성을 알려주어야 합니다. 암컷 랫트를 대상으로
한 동물실험에서 임신 중에 복용량의 이 약을 투여하였을 때 수컷새끼의 외음부기형을
초래하였습니다.
2) 이 약의 부서진 조각이 흡수되어 임부의 남성태아 외부생식기에 비정상성을 초래할 수
있으므로 이 약의 부서진 조각은 임부나 임신했을 가능성이 있는 여성이 취급해서는 안
됩니다. 그러나, 이 약은 깨어지거나 부서지지 않았다면 코팅이 되어 있어 정상적인 취
급시에는 수분분에 노출되지 않습니다.
3) 임상시험에서 이 약 5 mg/day를 6 ~ 24주 동안 복용한 피험자의 정액에서 소량의
피나스테리드가 회수되었습니다. 임신한 여성에게 이 약으로 치료를 받은 환자의 정액으
로 노출되게 되는 피나스테리드 농도는 rhesus 원숭이 동물실험에서 보고된 태아의 발
육 기형에 대한 no-effect level에 해당하는 피나스테리드의 농도보다 50 ~ 100배 낮
은 용량입니다.
4) 이 약의 무요로의 이행여부는 확실하지 않으며 수유부에는 투여하지 않습니다.

8. 소아에 대한 투여
소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 소아에게는 투여할 수 없습니
다.

9. 고령자에 대한 투여
외국에서 위약대조 임상시험(PLESS)에 참가한 피험자 중 65세 이상은 1,480명이었고
75세 이상은 105명이었습니다. 고령자와 젊은 피험자간의 안전성과 유효성에 유의한 차
이가 관찰되지 않았으며, 다른 임상적 경험에서도 고령자와 보다 젊은 환자간의 반응에
차이가 없었습니다. 고령자에 대한 용량조절이 필요하지 않습니다.

10. 임상감사치에의 영향
1) 이 약으로 치료를 받은 전립샘암 환자에서 임상적 효능은 입증되지 않고 있습니다.
대조 임상시험에서 연속적인 전립샘특이항원(PSA) 수치와 전립샘 생검으로 PSA가 증가
된 양성전립샘비대증 환자를 모니터링 하였습니다. 이러한 BPH임상시험에서, 이 약은
전립샘암 진단 비율을 변화시키지 않는 것으로 나타났습니다. 또한, 전립샘암의 전체적
인 발병률은 이 약으로 치료를 받은 환자 또는 위약 치료를 받은 환자에서 유의한 차이
가 없었습니다.
이 약은 전립샘암 존재 하에서도 양성전립샘비대증 환자의 혈청 PSA 농도를 대략 50
%정도 감소시킵니다. 이런 감소는 개별 환자에 따라 편차가 있긴 하지만, 전체 PSA수
치 범위에서 예측가능합니다. PLESS 임상시험의 3,000명 이상 환자로부터 얻은 PSA
자료 분석결과, 6개월 이상 이 약으로 치료를 받은 전형적인 환자의 PSA수치는 치료를
받지 않은 남성의 정상 범위와 비교시 2배로 조정해야 한다는 사실이 확인되었습니다.
이런 조정으로 PSA 분석의 민감도와 특이도가 보존되고, 전립샘암 진단능력을 유지할
수 있습니다.
이 약으로 치료를 받는 환자의 지속적인 PSA 수치 증가는 이 약의 치료에 대한 비순
응 문제를 고려하는 것을 비롯하여 주의깊게 평가해야 합니다.
유리 PSA수치, 백분율(총 PSA에 대한 유리 PSA의 비율)은 이 약으로 인해 유의하게
감소하지 않습니다. 총 PSA에 대한 유리 PSA의 비율은 이 약의 영향 하에서도 그대로
유지됩니다. 전립샘암 진단에 유리 PSA수치 백분율을 보조 수단으로 활용하는 경우, 이

수치에 대한 조정이 불필요합니다.
2) 양성전립샘비대증 환자에서, 이 약은 코티솔, 에스트라디올, 프로락틴, 갑상샘 자극 호
르몬 또는 티록신의 순환 정도에 영향을 주지 않았습니다. 혈장 지질 프로파일(즉 총 콜
레스테롤, 저밀도지단백, 고밀도지단백, 트리글리세리드) 또는 골밀도에 대한 임상적으
로 중요한 약물 효과는 관찰되지 않았습니다. 이 약을 복용하는 환자에서 황체형성호르몬
(LH)과 난포자극호르몬(FSH)이 약 10 % 증가하는 것이 관찰되었지만, 수준은 정상범위
이내였습니다.
건강한 지원자에서 이 약의 치료는 성선자극호르몬 방출 인자에 대한 LH와 FSH의 반
응을 변화시키지 않는데, 이는 시상하부-뇌하수체-고환축이 영향받지 않음을 시사합니
다.
건강한 남성 지원자에서 정액 파라미터를 평가하기 위한 24주간의 이 약 치료는 정액 농도,
운동성, 형태, pH에 임상적으로 유의한 영향을 주지 않았습니다. 사정시 전체 정액량이 감소
되었고 0.6 mL(22.1 %)의 평균 사정량 감소가 관찰되었습니다. 이들 파라미터는 정상 수준
범위 안에 있었으며 치료를 중단하자 소멸되기 시작하여 평균 84주후 기저 상태로 회복되었
습니다.
11. 과량투여시의 처치
1) 이 약의 과다 복용시에 권장되는 특별한 치료법은 없습니다.
2) 이 약을 400 mg까지 단회투여하거나 3개월간 1일 80 mg까지 반복 투여한 환자에서 이상
반응이 나타나지 않았습니다.
12. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로
이를 주의합니다.

[포장단위] 30정
[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
[사용(유효)기간] 제조일로부터 36개월
[제조자] 영풍제약(주), 인천광역시 남동구 함박로 333
[제조외의자] (주)휴비스제약, 대전광역시 대덕구 신일서로 104번길 46

▶ 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생
이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로, 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
▶ 본 제품은 엄격한 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거
나 변질 변패 오염되거나 손상된 의약품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
▶ 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보
상 받을 수 있습니다.
▶ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품
정보를 참조하십시오.
※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실 (070-4481-
6051)로 문의하시기 바랍니다.

설명서 작성일자 : 2014. 09. 25
설명서 개정일자 : 2017. 08. 22

