



앤디락생 캡슐

(바실루스리케니포르미스균)

K G M P
일반 의약품
분류번호: 237

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐(440mg) 중

바실루스리케니포르미스균(별규) ----- 250 mg

(*Bacillus licheniformis* 균으로서 2.5억마리)

첨가제(타르색소): 적색3호, 청색1호

첨가제(동물유래): 유당수화물(소-우유)

[성상] 백색의 분말이 든 상. 하부 홍색의 경질캡슐제

[효능·효과] 급·만성장염, 급·만성설사, 급성이질, 각종 원인에 기인한 장내 이상발효

[용법·용량]

(성인) 1회 2캡슐 1일 3회 복용

(유소아) 1회 1캡슐 1일 3회 복용

유아의 경우 캡슐내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

본 제(이 약)는 항생물질과 병용투여(함께 복용)하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용투여(함께 복용)는 피하는 것이 좋습니다.

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(못견딤)(증)(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍(부족)증(Lapp-lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의하십시오.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아(갓난아기)에게 투여할 경우에는 의사 또는 의사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[사용기한] 제조일로부터 24개월

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위

[설명서 개정연월일 / 관리번호] 2014.10.22 / P1411-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.

※ 최종 개정년월일(2014.10.22)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용보고: 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

제조의뢰자:



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(수신자요금부담전화)

학술상담실 : 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조사:

|주|바이넥스

부산시 사하구 대대로368-3