

※ 의약품 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 보관하십시오.

신로신정

일반의약품	
분류번호	399
KGMP	직격업체

【원료약품 및 그 분량】1정 중

지황(KP)	416.7 mg	치자(KP)	125.0 mg
당귀(KP)	416.7 mg	용담(KP)	125.0 mg
목통(KP)	416.7 mg	육계(KP)	16.7 mg
황금(KP)	250.0 mg	생강(생규)	16.7 mg
택사(KP)	250.0 mg	대황(KP)	16.7 mg
차전자(KP)	250.0 mg	마황(KP)	16.7 mg
감초(KP)	125.0 mg	연교(KP)	16.7 mg
(이상 수침건조엑스 200mg)			

첨가제(동물유래) : 유당(젖당)수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

【성상】 황갈색의 삼각형 정제

【효능·효과】 방광염, 요도염, 신장(콩팥)병, 신증후군, 부종(부기)

【용법·용량】 성인 1회 3~6정, 만 8세~15세 1회 2~3정

1일 2회, 아침 저녁으로 공복(빈 속)시에 복용해 주십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인 (이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 혹은 골반내 장기의 유출작용에 의해 유조산(조기분만)의 위험이 있습니다.)
- 수유부 (이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않습니다.)
- 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 다음과 같은 분은 복용전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.

- 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
- 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
- 부종(부기)이 있는 환자
- 의사의 치료를 받고 있는 분
- 지금까지 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증 등의 경향이 있으신 분
- 설사, 연변(똥은변)의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 현저하게 위장이 허약한 환자
- 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있습니다.)
- 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있습니다.)

3. 복용 시 다음 사항에 주의하십시오.

- 정해진 용법·용량을 엄수하십시오.
- 다음 약제와는 겸용하지 마아 주십시오 : 기타 설사제
- 소아에게 복용시켜야 할 경우에는 보호자의 지도감독하에 복용시키십시오.
- 본 제품은 5세 미만의 유아에게는 복용시키지 마십시오.

4. 복용 중 또는 복용 후 다음 사항에 주의하십시오.

- 본제(이 약)의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 약사에게 상담하십시오.
- 위알도스테론증: 1일 최대 복용량이 감소로서 1그램 이상인 제제는 장기연용(계속복용)할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지하십시오.
- 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지하십시오.

4) 소화기계: 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배아픔), 설사 등이 나타난 경우에는 복용을 중지하십시오.

5. 복용중 또는 복용후는 다음 사항을 주의하십시오.

- 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계이뇨제(푸로세미드, 에타크린산)또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여하십시오.
- 본 제품은 하제(설사약)성분도 포함되어 있으므로 복용에 의해 묽은변으로 되기도 하지만 만약 심한 복통(배아픔)을 수반하는 설사가 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담해 주십시오.
- 본 제품의 복용에 의해 위부불쾌감, 식욕부진, 설사, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담해 주십시오.
- 1-2개월간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는 복용을 중지하고 의사나 약사에게 상담해 주십시오.
- 장기연용(계속 복용)하는 경우에는 의사나 약사에게 상담해 주십시오.
- 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의합니다.
- 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 합니다.
- 다른 한방제제 등을 병용(함께 복용)하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의합니다. 대황 함유제제는 병용(함께 복용)투여시 특히 주의합니다.

6. 보관 및 취급상시 다음 사항에 주의하십시오.

- 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20정

【제조회사】 슈빌생명과학(주) / 경기도 화성시 양감면 두머리길 16

【제조지】 정우신약(주) / 충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60

【판매지】 (주)대웅생명과학 / 서울시 송파구 삼전로 42

※ 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자에게만 바꾸실 수 있습니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2016년 02월 15일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'에서 확인할 수 있습니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

☎ 소비자 상담실 (02)561-4011

첨부문서 최종 개정연월일 : 2016.02.15

1602-00