

근육경련 및 말초혈행개선제 마그맥스 연질캡슐

일반의약품
KCA-000000-000000
분류번호: 03160

[성분 · 함량] 1캡슐 중

주성분 : 산화마그네슘(KP)	250.0mg
(마그네슘으로서 150mg)	
주성분 : 토크페롤아세테이트(KP)	500.0mg
(비타민D로서 500IU)	
주성분 : γ -오리자놀(KP)	10.0mg
주성분 : 피리독신염산염(KP)	50.0mg
주성분 : 티아민질산염(KP)	50.0mg
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호	

[성상] 회백색의 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

[효능 · 효과]

1. 다음경우의 비타민 E, B₁, B₆, 의 보급

- 육체피로 - 임신 - 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이유기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어께 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 노인피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법 · 용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 영아
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 - 4) 신장(콩팥)장애 환자
 - 5) 저단백혈증 환자
 - 6) 임부
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장 박동정지), 중추신경계 기능저하
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.

- 4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증(Hypnatremia:혈액중에 나트륨이 과잉으로 존재하는 상태), 울혈심부전(CHF: 심장기능 저하로 신체조직이나 기관에 혈액을 공급할 수 없는 상태), 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테론제, 트리아미테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증(Hyperkalemia: 혈액의 칼륨농도가 정상 이상으로 과도하게 높아지고 있는 상태)을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 일반적 주의
 - 1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
8. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 마그맥스연질캡슐 60캡슐

[제조의회사]  **동화약품** / 본사 : 서울특별시 중구 후암로 98, 1층
공장 : 충청북도 충주시 충주산단1로 167

[제조자] 한국프라임제약(주) / 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

[소비자상담실] 080-023-1897

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
- 설명서 개정일자이후 변경된 내용은 식약처온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

개정일자 : 2014. 12. 19