

디아린캡슐

(디아세레인)

■ 성분 및 함량 : 1캡슐 중

디아세레인(별규) 50mg
 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소의 우유)
 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호

■ 성상 : 황갈색의 가루가 들어있는 상부 황색, 하부 연황색의 경질캡슐

■ 효능·효과

골관절염(관절증, 퇴행성 관절질환)

■ 용법·용량

성인 : 디아세레인으로서 1일 50~100mg을 1~2회 분할하여 식후 경구투여 합니다.
 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 염증성 대장 질환 환자(궤양성 대장염, 크론병)
- 2) 장폐색 증후군 환자
- 3) 원인불명의 복통 환자
- 4) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 Rhein계(안트라퀴논 배당체) 약물에 과민반응 환자
- 5) 중증의 간부전 환자
- 6) 15세 미만의 소아
- 7) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose - galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 소장, 결장 질환의 병력이 있는 환자(이 약은 안트라퀴논류이므로 투여하지 않거나 또는 신중히 투여합니다.)
- 2) 임부 및 수유부
- 3) 고령자(용량 감소가 필요합니다.)
- 4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 설사, 묽은 변, 복통, 장기투여 시 위장장애(출혈, 궤양 및 천공), 드물게 직장 점막의 색소 침착이 나타날 수 있습니다.
- 2) 피부 : 가려움, 발진, 습진 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

장기 연용할 경우 의사의 지시에 따릅니다.

5. 상호작용

- 1) 칼슘, 마그네슘, 알루미늄을 함유하는 제산제 및 소금은 이 약의 위장관 흡수를 저해하므로 가능하면 2시간 이상의 간격을 두고 투여합니다.
- 2) 이뇨제와 병용투여시 이뇨작용이 약하게 증강될 수 있습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 태자의 골형성 지연이 보고 되었습니다.
- 2) 이 약이 인체 내에서 태자에 미치는 영향에 대한 자료는 없으나 모유 중으로 안트라퀴논 유도체가 소량 이행되므로 임부 및 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

7. 과량투여시의 처치

- 1) 증상 : 과량투여 시 심한 설사가 나타날 수 있습니다.
- 2) 처치 : 필요시 전해질 공급 등의 대증요법을 실시합니다.

■ 사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장 단위 : 자사포장단위

■ 제조자 : 대화제약(주), 강원도 횡성군 횡성읍 한우로 495

※ 본 의약품은 우수의약품제조관리기준을 필한 제품입니다. 첨부문서를 읽은 후 사용(유효)기간을 반드시 확인하시고 복용하여 주시기 바랍니다. 사용(유효)기한이 경과 되었거나 유통 과정 중에 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입 했을 때에는 구입한 약국이나 병의원을 통해 교환해 드립니다. (소비자상담실 : 041-951-4300)

※ 설명서 작성된 이후 변경내용은 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 의약품 정보 또는 당사 홈페이지 www.globalpharm.co.kr의 각 제품 란에 기재되어 있으니 참조하시기 바랍니다.

----- 약은 어린이 손에 닿지 않게 보관해야 합니다. -----

작성일자 2014년 10월 31일

제조의회사



(주)한국글로벌제약

www.globalpharm.co.kr

충남 서천군 종천면 종천공단32번길 26