



■ 원료약품의 분량 : 이 약 1정 중

유효성분 : 아세트아미노펜(KP)	500mg
수도아페드린염산염(USP)	30mg
클로르페니라민말레산염(KP)	2mg

첨가제(동물유래성분) : 스테아르산마그네슘(소의 기름)

기타 첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 히드록시프로필셀룰로오스, 카복시메틸셀룰로오스칼슘, 경질무수규산, 오파드라이 흰색(85F18422)

■ 성상 : 흰색의 장방형 필름코팅정제

■ 효능·효과 : 감기의 증상(여러증상)콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통의 완화

■ 용법·용량 : 성인 및 12세 이상의 어린이 : 매 6시간 마다 2정 복용, 최대 하루 8정을 초과할 수 없다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 하고, 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.
- 수도아페드린 함유 의약품 복용 시 급성 전신성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

3. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 지금까지 이 약에 의한 과민증상(발진, 발적·종혈되어 붉어짐, 가려움, 부종·부기(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 다음 사람은 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 가지고 있는 사람
 - 지금까지 이 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
 - 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기)·유아 및 14세 이하의 어린이
 - 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
 - 녹내장에 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변)을 곤란함이 있는 사람.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

5. 복용시 다음 사항을 주의할 것

- 용법·용량을 잘 지킬 것
- 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것
진해거담제를 그치게 함(거담제(가래약), 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등).
- 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
- 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 유아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다는 보고가 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴·등·팔 등)과 함께 안색이 창백해지고, 수축(손발이 차가워지고 식은땀, 숨가쁨 등)이 나타나는 경우
 - 고열을 수반하며 발진, 발적·종혈되어 붉어짐, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타나는 경우
 - 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP), 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 천식이 나타나는 경우
 - 수도아페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(격격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 바르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

6. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

- 복용하는 동안 발진, 발적·종혈되어 붉어짐, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증(아지러움) 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 수화(여러차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의 할 것.
- 장기 연용(계속 복용)하지 말 것

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1 ~ 30℃) (사용기간 : 제조일로부터 36개월)

■ 포장단위 : 10정/PTP

■ 첨부문서 최종 개정일 : 2019년 12월 30일

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용 기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나
당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은
<http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.