

# 고함량 비타민D 함유제제

## 맥스디 800 연질캡슐

### ■ 성분 · 함량 : 1캡슐 중

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 농축콜레칼시페롤(유상형) (BP) | 0.80mg  |
| (비타민D로서 800IU)     |         |
| 토코페롤아세테이트 (KP)     | 10.00mg |
| (비타민E로서 10IU)      |         |
| 착색제(천연색소) : 락색소    |         |

### ■ 성상 : 연노랑의 투명한 내용물을 함유한 적색의 타원형 연질캡슐

### ■ 용법 · 용량 : 만 12세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐 복용

### ■ 효능 · 효과

1. 다음 경우의 비타민 D, E 의 보급
  - 임신 · 수유기, 발육기, 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.
  - 뼈, 이의 발육불량
  - 구루병의 예방

### ■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
  - 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
  - 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
  - 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
  - 4) 신장결석 환자
2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
  - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
    - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
  - 3) 신장결석 병력이 있는 환자
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

: 구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)

2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.

3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.

4) 우발적으로 과량복용 한 경우

5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

#### 4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.

#### 5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

■ **저장방법**: 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

■ **사용기간**: 제조일로부터 24개월

■ **포장단위**: 60, 120연질캡슐

■ **제조의뢰자**: (주)테라젠이텍스 (경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동))

■ **제조사**: (주)알피코프 (경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

■ **판매자**: (주)종근당 계열회사 (주)경보제약 (서울특별시 서대문구 충정로 8)

---

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손이 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다.

※ 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결 기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02)3463-7110이나 [www.etexpham.com](http://www.etexpham.com)에서 확인할 수 있습니다.

---