

말초혈행장애 및 근육경련 개선 토코탐 연질캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

산화마그네슘(KP)	250mg
(마그네슘으로서 150mg)	
토코페롤아세테이트(KP)	500mg
(비타민E로서 500IU)	
γ-오리자놀(KP)	10mg
피리독신염산염(KP)	50mg
티아민질산염(KP)	50mg

연질캡슐기재(동물유래): 젤라틴, 숙신산젤라틴 (소, 가축)
침가제(타르색소): 적색40호 황색5호 청색호

[성상] 화백색의 유상물질(기름상태물질)이 들어있는 적갈색의 정방형 연질캡슐제

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 말초혈행장애 및 경련기시 다음 증상의 완화: 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(하)리통, 어깨 결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
- 각기 - 노인 피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지 할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적증혈되어 붉어짐, 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전 수축(심장박동 정지), 중추신경계 기능저하

- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘) 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 6) 항알도스테로제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼혈증증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
- 7) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법 및 사용(유효)기간]

기밀용기, 실온보관(±30℃), 제조일로부터 24개월

[포장단위] 60캡슐, 60캡슐×2

[제조자] 한국코리안제약주

전북 완주군 동동읍 완주산단9로 100

[제조(외)자] (주)한국코리안제약 / 충북 제천시 강제로 30

[판매자] 보령제약주 / 경기도 안산시 단원구 능안로 107

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 자세한 의약품정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 검색을 참고하여 주세요.

※ 포장에 완전히 제거되었는지, 알러미음 호일이 따라 나오지 않았는지 여부 반드시 확인 후 복용하시기 바랍니다.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

작성연월일: 2014. 11. 05