

031219

광범위 피부질환 치료제

클리스톤지크림

※ 사용 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

유효성분 : 베타메다손발레레이트(KP) 0.61mg
 겐타마이신항생성(KP) 1mg(역가)
 첨가제(보존제) : 클로로크레솔 1mg
 기타 첨가제 : 마크로폴스테아레이트, 세탄올, 스테아릴알코올, 유동 파라핀, 정제수, 폴리소르베이트80, 프로필렌글리콜

【성상】 전질균등한 흰색의 크림

【효능·효과】

- 2차 감염된 일례기성 또는 염증성 피부질환 : 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순대상, 간질진(피부스침증), 박탈피부염, 가려움, 간선(미끈비늘증)

- 1도 화상

【용법·용량】 1일 1~3회 환부(질환 부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·스피로헤타속·효모·바이러스(대상포진(물집), 단순포진(물집), 수두, 풍두증 등)·동물(을, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(중상이 악화될 수 있다)
- 2) 이 약 또는 이 약성분에 과민증 및 고혈압이 있는 환자
- 3) 고약(천공(물집)이 있는 습진성 외이도염 환자(천공(물집)부위의 치유 지연이 나타날 수 있다)
- 4) 케알레트제트(제외), 제2도 심재성(드러나지 않는)이상의 화상·동상 환자(피부 재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다)
- 5) 입주위피부염, 보통여드름, 주사(rosacea) 환자
- 6) 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 의한 과민증 및 고혈압이 있는 환자 (아미노글리코사이드계 항생물질사이에는 교차 알레르기발생이 입증되었다)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 일례기성 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
- 2) 유·소아
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 피부

① 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진(고름딱지증), 모낭염 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다. 밀봉봉대법(OOT)의 경우 나타내기 쉽다. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하여 사용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.

② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 느낌), 발열, 적열감(화끈감), 가려움, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 홍조, 피부건조, 농포(고름물집)성피부염, 껍질, 상처 악화, 욕창, 농포(고름물집)증, 과민증, 피부반응, 다모증(털과다증), 여

드름상발진, 색소침착(자주증, 입주위피부염, 일례기성접촉피부염, 피부자극, 2차 감염, 피부위축, 줄무늬 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다. 겐타마이신으로 치료하면 일시적인 피부자극(홍반(붉은 반점), 가려움증)이 나타날 수 있다. 일반적으로 치료를 중지할 필요는 없다.

③ 장기(연용(계속 사용)) : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관 확장, 자반(자주세 반점), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면전체에 홍반(붉은 반점), 모세혈관확장, 딱지, 인설(검질), 어린이(습진)와 피부변화, 다모(털과다), 색소침착 등)이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.

2) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신투여와 같은 뇌하수체·부신피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.

3) 눈 : 안검(눈꺼풀) 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후방백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.

4) 균과대항성 : 국소적용 항생물질제제를 장기간 사용한 경우에 때때로 진균(곰팡이)을 포함한 비감수성균의 균과대항성(superinfection)을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 적절한 처치를 한다.

5) 신장(신장장애), 난청(귀먹음) 등이 나타날 수 있으므로 장기(연용(계속 사용))를 피한다.

5. 기타 이 약의 사용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜나.
- 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
- 3) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)축의 억제, 쿠싱증후군, 고혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA 축억제를 검사한다.
- 4) 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었으면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
- 5) 치료기간은 질환의 정도나 병소(아픈 부위)의 범위, 환자의 반응에 따라 다르다. 그러나 3~4주 치료 후에도 증상이 개선되지 않으면 다른 질환을 의심해 보아야 한다. 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
- 6) 증상이 개선되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
- 7) 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉봉대법을 사용함으로써 코르티코이드제를 전신적으로 투여한 경우와 같은 증상이 나타날 수 있다. 특별한 경우를 제외하고는 장기, 대량사용 및 밀봉봉대법을 피한다.
- 8) 감작(과민상태로 만들)할 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작

(과민상태로 만들)후(발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지한다.

9) 장기(연용(계속 사용)) 하지 않는다.

10) 코르티코이드 및 겐타마이신은 밀봉봉대법 또는 광범위한 부위 적용, 장기(연용(계속 사용))등으로 인해 피부를 통해 흡수된다. 이러한 경우에는 정기적인 관찰 및 치료에 앞서서 BUN 검사 등을 통한 신기능 검사가 권장된다.

11) 겐타마이신 국소투여시 전신적인 효과가 나타나지 않지만, 전신독성을 나타낼 수 있는 농도에서는 신부전환자 또는 제8호 신경환자에서는 영구적인 전정(前庭(평형))기능장애의 원인이 될 수 있다.

12) 입부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 입부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

13) 국소적으로 투여된 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의하여야 하며, 수유부에 대한 이 약의 투여가 필요한 정도를 고려하여 수유를 중지하거나 이 약의 투여를 중지한다.

14) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다. 국소적용 코르티코이드로 치료받은 소아에게서 HPA축억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 체중증가의 지연 및 두개골내고혈압의 발생이 보고된 바 있다. 소아에게서 발견되는 부신억제의 징후는 혈장 코르티솔 수치가 낮아지고 ACTH 자극에 반응이 없는 것이다. 두개골내고혈압의 징후로는 솟구멍의 돌출(bulging fontanelle), 두통 및 양쪽시신경유두부종(papilledema)이 있다.

15) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.

16) 소아환자에게 사용할 경우에는 치료 효과를 나타내는 최소양만을 사용한다.

17) 국소용 코르티코이드의 과다사용 또는 장기사용 시 뇌하수체-부신기능을 억제하여 2차적인 부신기능부전증을 유발하고 쿠싱증후군을 포함하는 고코르티솔혈증을 유발시킬 수 있다. 겐타마이신을 국소과다 또는 장기간 사용하였을 때는 병소부에 진균 또는 비감수성 균의 과다한 증식이 일어날 수 있다. 이러한 경우 적절한 대증적 치료가 필요하다. 급성 고부신피질호르몬증상(hypercorticotid symptoms)은 보통 가역적이다. 필요할 경우 전신적 불균형을 치료하여야 한다. 만성독성인 경우 코르티코이드를 서서히 감량(줄임)하여 중단하여야 한다.

18) 간선(미끈비늘증)환자에 장기, 대량 사용할 경우에는 치료 중 또는 치료종지 후에 간선(미끈비늘증)증 흉파증(홍색피부증), 농포(고름물집)성 간선(미끈비늘증) 등이 나타나는 보고가 있다.

6. 적용상의 주의

- 1) 인공으로 사용하지 않는다.
- 2) 화상이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
- 3) 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 않는다(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부(질환 부위)를 청결히 한다).

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 30그램/튜브

※ 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(<http://www.drugsafe.or.kr>) → 의약품 이상사례보고에 알리도록 하십시오

※ 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보 참조

※ 만일, 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오염되었거나 손상된 제품이 발견된 경우에는 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환해 드립니다.

부광약품주식회사

제조회사 : 부광약품(주) 경기도 안산시 단원구 능안로 47
 제조자 : (주)세트리 경기도 남양주시 경강로 27

국민 건강을 위해 꾸준히 노력해 온 저희 부광약품은 소비자의 편의를 위해 부광약품이 특허료를 부담하는 소비자상담실을 운영하고 있습니다. 제품 문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 지금 전화해 주십시오.

◆ 소비자 상담실 : TEL 080-933-2233
<http://www.bukwang.co.kr>

※ 이 첨부문서 작성일자(2019년 3월 12일) 이후 변경된 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.