



의약품 분류번호	264
	전문의약품

□원료약품 및 그 분량

1g 중	
모메타손푸로에이트(USP).....	1.0mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	1.8mg
파라옥시벤조산프로필(KP).....	0.2mg

□성상

전질균등한 흰색 크림

□효능·효과

코르티코이드에 반응하는 피부질환의 가려움 및 염증의 완화

□용법·용량

- 1일 1회 환부에 얇게 바르고 완전히 스며들 때까지 가볍게 문지른다.
- 밀봉봉대법은 삼가한다.

□사용상의 주의사항

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물·음, 서면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 고막 천공이 있는 습진성 이도염 환자(천공부위의 치유 지연이 나타날 수 있다.)
 - 케양(베테트병 제외), 제2도 심재성 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다.)
 - 입주위피부염, 보통여드름, 주사 환자
 - 항문주위·생식기가려움 환자
 - 2세 이하의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
 - 유·소아
 - 고령자
 - 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 부작용
 - 피부
 - 감염증 : 피부의 세균성(전염성 농가진, 모낭염 등) 및 진균성(칸디다증, 백선 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다.밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나지 않다. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균제 등을 병용하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
 - 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 지름, 발열, 작열감, 발진, 발적, 홍조, 가려움, 피부건조, 농포성 피부염, 알레르기성 접촉피부염, 껍질, 한진, 상처악화, 욕창, 농포증 등이 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 장기 연용 : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관확장, 자반), 스테로이드성 주사, 입주위 피부염(입주위·안면전체에 홍반, 구진, 모세혈관확장, 딱지, 인설), 어린이(鰻鰻)양 피부변화, 다모, 색소탈실, 선조, 수포성피부염, 아토피피부염, 피부출혈 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
 - 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신 투여와 같은 뇌하수체·부신 피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
 - 눈 : 안검피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후낭하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.

4. 일반적주의

- 피부 감염을 수반하는 습진·피부염에는 사용하지 않는 것을 원칙으로 하지만 부득이하게 이 약을 사용하는 경우에는 먼저 적절한 항균제(전신적용), 항진균제로 치료하거나 이들과의 병용을 고려한다.
- 국소 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에서 가역적인 사상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축의 억제, 쿠싱증후군, 과월당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소 코르티코이드를 광범위한 체표면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH 자극시험을 하여 HPA축 억제 를 검사한다.
- 국소 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 활성이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
- 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
- 증상이 개선되면 가능한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
- 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 동물실험에서 비교적 적은 용량의 코르티코이드를 전신적으로 투여한 경우, 좀 더 강력한 코르티코이드 피부도포로 인해 기형발생이 나타났다.
 - 임부에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에 대해서는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 국소적으로 투여한 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드 가 모유 중으로 이행하므로 수유부에투여시 주의한다.
- 소아에 대한 투여
 - 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 두개내압 항진 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다.
 - 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
 - 3주 이상 연용하여 사용하지 않는다.
- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 부작용이 나타나기 쉬우므로 대량, 장기간, 광범위하게(특히 밀봉봉대법) 사용할 경우 충분한 관찰하는 등 주의한다.
- 적용상의 주의
 - 인공용으로 사용하지 않는다.
 - 화장 또는 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
 - 의사의 감독 없이 밀봉봉대법을 사용하지 않는대특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용전에 환부를 청결히 한다).
- 자장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 기타
 - 국소 코르티코이드가 실험동물의 수태능력에 미치는 영향이나 발생성 여부를 평가하는 만성시험은 실시되지 않았다.
 - 이 약의 유전독성시험(Ames시험, 마우스 림프종 시험, 소핵시험)에서는 돌연변이 유발가능성이 나타나지 않았다.

□포장단위

15g

□저장방법

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

□제조·회사의 및 제조자

- 제조판매자 : 제이더블유중외신약(주) 경기도 평택시 산단로 88-24
- 제조회회사 : 제이더블유생명과학(주) 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28

□첨부문서 작성연월일

2014. 12. 12

- 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- 이 첨부 문서 작성 일자(2014년 12월 12일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 www.jw-shinyak.co.kr이나 고객센터 1588-4675에서 확인하실 수 있습니다.

jw 중외신약
제이더블유중외신약(주)