



기침 · 가래약

뮤스티캡슐 200mg (아세틸시스테인)

K G M P
일반의약품
분류번호: 222

[성상] 흰색 분말이 든 상하부 흰색의 캡셀제

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐(345mg) 중

아세틸시스테인(USP) ----- 200mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과

- 다음 질환에서의 객담(가래)배출곤란: 급·만성기관지염, 기관지확장증, 천식성기관지염, 기관지천식, 세기관지염, 만성염증증
- 인 · 후두염, 부비강염, 삼출성 및 장액성중이(가운데귀염)

【용법 · 용량】

아세틸시스테인으로서 다음 용량을 식전에 소량의 물과 함께 경구투여 하십시오.

- 급성질환
 - 성인: 1회 200mg 1일 3회
 - 소아: 6~14세 1회 200mg 1일 2회
- 만성질환
 - 성인: 1회 200mg 1일 2회
 - 소아: 6~14세 1회 100mg 1일 3회
- 만성염증증
 - 소아: 6세 이상 1회 200mg 1일 3회, 2~5세 1회 100mg 1일 4회
 - 연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 이 약에 과민증 환자
- 위 · 십이지장궤양 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

신생아 (중증 질환이 아닌 경우 신생아에게 투여하지 않습니다.)

3. 부작용

- 소화기계: 드물게 구역, 구토, 구내염(입안염), 가슴쓰림, 설사 등이 나타날 수 있습니다.
- 과민증: 드물게 두드러기, 가려움, 발진, 두통, 이명(귀울림), 기관지경련(특히 천식 환자) 등이 나타날 수 있습니다.
- 드물게 빈맥(빠른맥), 고혈압이 나타날 수 있습니다.

4. 상호작용

경구용 항생물질(아목시실린, 세푸록심, 독시사이클린, 에리스로마이신, 치암페니콜)과 병용투여시 항생물질의 약효를 감소시킬 수 있습니다(적어도 2시간의 간격을 두고 투여하십시오).

5. 임부에 대한 투여

임부에 대한 적절한 연구가 없으므로 반드시 필요한 경우에만 투여하십시오.

6. 수유부에 대한 투여

이 약이 모유로 분비되는지 알려지지 않았으나 많은 약들이 모유로 분비되므로 수유부에 투여할 경우에는 신중히 투여하십시오.

7. 적응상의 주의

이 약의 용액에 다른 약물의 첨가는 피해야 합니다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2015.01.06 / P1412-01

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자 분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상에 드립니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 첨부문서 최종 개정연월일(2015.01.06)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 부작용보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조의회사:



일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110
소비자상담실: 080-021-1010(수신자유금부담전화)
학술상담실: 02-570-3888 홈페이지 www.ilyang.co.kr

제조자:

(주)유영제약

충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33