

치매 치료제

알프페질정 5mg, 10mg

(도네페질염산염)

Altsupezil Tab. 5mg, 10mg

알츠하이저질병은 Acetylcholinesterase Inhibitor로써 아세틸콜린분해효소와 기억적으로 결합하여 아세틸콜린의 가수분해를 억제하여 Cholinergic synapse의 아세틸콜린 농도를 상승시킵니다.

【특장점】

- [illegible]

[원료약품의 분량] 1성 중
5mg : 도나페실염산염(USP) 5.0mg

10mg : 도네패실염산염(USP) 10mg

첨가제(티오텍소): 황색 203호, 황색 5호, 청색 2호

[성 상]

5mg : 흰색의 원형 필름코팅정
10mg : 노란색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

알츠하이머형 치매증상의 치료

【용법·용량】

- [illegible]

[사용상의 주의사항]

1. 다른 환자에게 투여하지 말 것
2. 드물게대장염성열, 피로감이나 유도제 또는 이 약의 구성성분에 과민반응 현지
3. 일부 또는 일시적으로 위장 기능상해 또는 설염 및 소화불조
4. 이 약은 우유를 함유하고 있으므로, 갈락토제 불내증(galactose intolerance), Лаг 유당분해효소 결핍증(Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토제 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에서는 투여하면 안 된다.
5. 다른 환자에게는 투여하지 말 것
6. 투여 초기부터, 심한 설사 및 발열성발부종현상 등 심장질환 환자나주신장사구체기능으로 인해 사변을 일으키지 못하거나 배설할 수 있는 환자에서 있다
7. 노인에게서도 노인 이상 반응현상을 투여한다. 현저 또는 소화불량등의 병적 현상(위산분비 촉진 및 소화불조 증후군)을 초래할수 있다. 약화될 수 있는 환자에서 있다
8. 이 약 폐쇄폐질환 병적 현상(폐쇄성폐질환)의 수준 및 기원지역에 분비 항원으로 증상을 악화될 수 있다
9. 주위인종(아프리카계, 카리브계중후군) 현상(신장조직의 콜린계신경의 항원으로 증상을 유발 또는 악화시킬) 가능성 있다
10. 이 약은 광범위항생제중후군 POF, Serratia Yellow POF을 함유하고 있으므로 이 신분에 과민하게 반응할 수 있다. 이 환자에게는 신장조직에 항생제에 POF에 대해

- [illegible]

⑧ 호흡고란
⑨ 급성 췌장염
⑩ 급성 신부전
⑪ 원인을 알 수 없는 돌연사

신상개	원각** *상** 공리저렴트**	방안쪽, 방면쪽, 종용 성용주기 수 주주	익용 신강민: 원소리 양식 무용주 본도 무선식 운동과다중
신용개	실신* 아기귀음, 진안, 진선	방각*	주제외교 충성 은비
신원개		서역, 삼계한친	동방식 가난, 방식저단
소외개	실사 구역	역강강출형 역상이지장래양 변비, 태열발비	삼림고관, 대면실금
간-연도개			간연용 포유형 진 장애 **
비파 및 비파조식		방진 가면유중	
근골격계 질환 조직 및 뼈		근육 강면	근육통
신장 및 비뇨기개		요실금	빈뇨 요정제
선선 및 눈이 부어	두통	비노, 불통, 지통	부통 (안면부통 포함), 발열, 체온상조
장애개	헤미프리트진소	백혈구진소증	빈혈, 혈소판진소증

반토는 매우 작았으며(0.01%), 지렁이(1.0~10.0%), 배미(0.01~0.1%), 드물게(0.01~0.1%), 매우 드물게(0.01%)로 구분하였다.

- 살아있는 민족에 대한 인식연구실 설문록 또는 동지적 연대의 가능성에 고려되어야한다.
 학자, 종교 및 공직적 행동은 윤리 감성 또는 치료 주체가 사라졌다.
 설마할 수 없는 기근은 장래의 건이 이익의 뒤에 중첩되어 그려졌으니 한다.
 (3) 이 인권의 인권관계는 긴급요: 이익의 뒤에 후고된 이상반응은 다음과 같다.
 ① 인권과 및 범세계: 반성윤리
 ② 시간경계 비정치적 몸
 ③ 국내 사법조 조지칼과

[illegible]

- [illegible]

- 이 약의 투여량과 관련성이 있을 것으로 보이는 가장 중요한 이상반응은
 이 약을 투여받은 환자에서 적어도 5%의 빈도로 보고된 위약군에 비해 2배 이상이며, 이 약의
 평균투여량(약물)에 기반한 것으로 추정되는 이상반응으로 정당한 치료 흔한 이상반응은 설사, 식욕
 감퇴, 구토, 구역과 관련성이 있을 것으로 보인다. 이러한 이상반응은 주로 중증과 임상적으로 유사한
 다른 용량 투여의 필요 없이 회복된다. 이를 보는 위약대조군 시험에서 이 약을 투여받은 환자 중
 적어도 2% 이상에서 보고되고 위약 군에 비해 발생률이 더 높은, 투여로 인한 장출수 증상을
 동반한 것이다.
- 복합된 임상시험에서 보고되고 이상반응

중증 일차적이거나 치매증상에 대한 특정한 임상상황에서, 이 약을 투여받은 피험자 중 최소 2%에서 보고되고 있던 투여군에 비해 발생률이 높은 이상반응		
소계 기력/이상반응	위약(n=392)	이 약(n=501)
전신	73	81
시각	12	13
감각	9	11
두통	3	4
통증	2	3
근통/근	2	3
발열	1	2
피로	1	2
심혈관계		
고혈압	2	3
중상	1	2
안진	1	2
소화기계		
설사	4	10
구토	4	8
식욕 감소	4	8
구개	2	6
알레르기 및 면역계		
반응 출혈	2	5
대사 및 영양계		

CIK 증가	1	3
탈수	1	2
신장 질환	1	2
신경계		
불면증	4	5
척개염	2	3
신경쇠	2	3
환각	1	3
졸음	1	2
어지러움	1	2
우울증	1	2
혼란	1	2
강장 불안정성	1	2
성적 이상	1	2
피부 및 피부 부속기		
습진	2	3
비뇨기계		
요실금	1	2

- [illegible]

[illegible]

- [illegible]

악은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

(3) 비요기계 : 이 약의 임상시험에서는 나타나지 않았지만, 졸음 등 부작용으로 인해 방광의 배뇨를 방해할 수 있다.

- [illegible]

싱호작용

- [illegible]

1. 한문 사용에 있어 계층과 세대의 이차적 사회화 현상으로 볼 때, 교육이 계층이나 세대별로 학습자의 학습자 인식에 차이를 초래할 수 있다. 동문 학습자의 78명 학습자 인식에서 '어느 세대의 생도들이 사·술에 능숙할 수 있겠나' 질문에 대해 장년층의 무응답, 일련사자 1명, 2명, 3명, 4명, 5명, 6명, 7명, 8명, 9명, 10명, 11명, 12명, 13명, 14명, 15명, 16명, 17명, 18명, 19명, 20명, 21명, 22명, 23명, 24명, 25명, 26명, 27명, 28명, 29명, 30명, 31명, 32명, 33명, 34명, 35명, 36명, 37명, 38명, 39명, 40명, 41명, 42명, 43명, 44명, 45명, 46명, 47명, 48명, 49명, 50명, 51명, 52명, 53명, 54명, 55명, 56명, 57명, 58명, 59명, 60명, 61명, 62명, 63명, 64명, 65명, 66명, 67명, 68명, 69명, 70명, 71명, 72명, 73명, 74명, 75명, 76명, 77명, 78명, 79명, 80명, 81명, 82명, 83명, 84명, 85명, 86명, 87명, 88명, 89명, 90명, 91명, 92명, 93명, 94명, 95명, 96명, 97명, 98명, 99명, 100명, 101명, 102명, 103명, 104명, 105명, 106명, 107명, 108명, 109명, 110명, 111명, 112명, 113명, 114명, 115명, 116명, 117명, 118명, 119명, 120명, 121명, 122명, 123명, 124명, 125명, 126명, 127명, 128명, 129명, 130명, 131명, 132명, 133명, 134명, 135명, 136명, 137명, 138명, 139명, 140명, 141명, 142명, 143명, 144명, 145명, 146명, 147명, 148명, 149명, 150명, 151명, 152명, 153명, 154명, 155명, 156명, 157명, 158명, 159명, 160명, 161명, 162명, 163명, 164명, 165명, 166명, 167명, 168명, 169명, 170명, 171명, 172명, 173명, 174명, 175명, 176명, 177명, 178명, 179명, 180명, 181명, 182명, 183명, 184명, 185명, 186명, 187명, 188명, 189명, 190명, 191명, 192명, 193명, 194명, 195명, 196명, 197명, 198명, 199명, 200명, 201명, 202명, 203명, 204명, 205명, 206명, 207명, 208명, 209명, 210명, 211명, 212명, 213명, 214명, 215명, 216명, 217명, 218명, 219명, 220명, 221명, 222명, 223명, 224명, 225명, 226명, 227명, 228명, 229명, 230명, 231명, 232명, 233명, 234명, 235명, 236명, 237명, 238명, 239명, 240명, 241명, 242명, 243명, 244명, 245명, 246명, 247명, 248명, 249명, 250명, 251명, 252명, 253명, 254명, 255명, 256명, 257명, 258명, 259명, 260명, 261명, 262명, 263명, 264명, 265명, 266명, 267명, 268명, 269명, 270명, 271명, 272명, 273명, 274명, 275명, 276명, 277명, 278명, 279명, 280명, 281명, 282명, 283명, 284명, 285명, 286명, 287명, 288명, 289명, 290명, 291명, 292명, 293명, 294명, 295명, 296명, 297명, 298명, 299명, 300명, 301명, 302명, 303명, 304명, 305명, 306명, 307명, 308명, 309명, 310명, 311명, 312명, 313명, 314명, 315명, 316명, 317명, 318명, 319명, 320명, 321명, 322명, 323명, 324명, 325명, 326명, 327명, 328명, 329명, 330명, 331명, 332명, 333명, 334명, 335명, 336명, 337명, 338명, 339명, 340명, 341명, 342명, 343명, 344명, 345명, 346명, 347명, 348명, 349명, 350명, 351명, 352명, 353명, 354명, 355명, 356명, 357명, 358명, 359명, 360명, 361명, 362명, 363명, 364명, 365명, 366명, 367명, 368명, 369명, 370명, 371명, 372명, 373명, 374명, 375명, 376명, 377명, 378명, 379명, 380명, 381명, 382명, 383명, 384명, 385명, 386명, 387명, 388명, 389명, 390명, 391명, 392명, 393명, 394명, 395명, 396명, 397명, 398명, 399명, 400명, 401명, 402명, 403명, 404명, 405명, 406명, 407명, 408명, 409명, 410명, 411명, 412명, 413명, 414명, 415명, 416명, 417명, 418명, 419명, 420명, 421명, 422명, 423명, 424명, 425명, 426명, 427명, 428명, 429명, 430명, 431명, 432명, 433명, 434명, 435명, 436명, 437명, 438명, 439명, 440명, 441명, 442명, 443명, 444명, 445명, 446명, 447명, 448명, 449명, 450명, 451명, 452명, 453명, 454명, 455명, 456명, 457명, 458명, 459명, 460명, 461명, 462명, 463명, 464명, 465명, 466명, 467명, 468명, 469명, 470명, 471명, 472명, 473명, 474명, 475명, 476명, 477명, 478명, 479명, 480명, 481명, 482명, 483명, 484명, 485명, 486명, 487명, 488명, 489명, 490명, 491명, 492명, 493명, 494명, 495명, 496명, 497명, 498명, 499명, 500명, 501명, 502명, 503명, 504명, 505명, 506명, 507명, 508명, 509명, 510명, 511명, 512명, 513명, 514명, 515명, 516명, 517명, 518명, 519명, 520명, 521명, 522명, 523명, 524명, 525명, 526명, 527명, 528명, 529명, 530명, 531명, 532명, 533명, 534명, 535명, 536명, 537명, 538명, 539명, 540명, 541명, 542명, 543명, 544명, 545명, 546명, 547명, 548명, 549명, 550명, 551명, 552명, 553명, 554명, 555명, 556명, 557명, 558명, 559명, 560명, 561명, 562명, 563명, 564명, 565명, 566명, 567명, 568명, 569명, 570명, 571명, 572명, 573명, 574명, 575명, 576명, 577명, 578명, 579명, 580명, 581명, 582명, 583명, 584명, 585명, 586명, 587명, 588명, 589명, 590명, 591명, 592명, 593명, 594명, 595명, 596명, 597명, 598명, 599명, 600명, 601명, 602명, 603명, 604명, 605명, 606명, 607명, 608명, 609명, 610명, 611명, 612명, 613명, 614명, 615명, 616명, 617명, 618명, 619명, 620명, 621명, 622명, 623명, 624명, 625명, 626명, 627명, 628명, 629명, 630명, 631명, 632명, 633명, 634명, 635명, 636명, 637명, 638명, 639명, 640명, 641명, 642명, 643명, 644명, 645명, 646명, 647명, 648명, 649명, 650명, 651명, 652명, 653명, 654명, 655명, 656명, 657명, 658명, 659명, 660명, 661명, 662명, 663명, 664명, 665명, 666명, 667명, 668명, 669명, 670명, 671명, 672명, 673명, 674명, 675명, 676명, 677명, 678명, 679명, 680명, 681명, 682명, 683명, 684명, 685명, 68

- 임상검사치에의 영향
임상시험결과와 실험실 수치에서 주목할 만한 이상은 없었으나, 이 약의 투여로 인해 근육CK(CPK), LDH, AST, ALT, γ -GPT, ALP, BUN, 총콜레스테롤, 중성지방, 아밀라아제, 소변아밀라아제의 농도가 약간 증가할 수 있다.
과량투여시의 처치

- 1) 중성 : 폴리카보나테라제 억제제의 과량투여로 중성의 구역, 구토, 배변부비되고, 발한, 사색, 시력장애, 호흡장애, 식욕, 경련 등의 폴리카보나테 작용과 관련된 위험이 나타날 수 있다. 근육 쇠약상이 일어날 수 있으며 호흡기 기능에 이차적으로 사망할 수도 있다.

- 2) 차) 고령화병 예방을 위해 일반인적 방법으로 차한다. 3)항콜린제에 대한노인환상증후를 이인 고령화병에 대한 해독제제 사용 할 수 있다. 아트로핀제 경구 초기량 10~20mg씩 3회씩투여 한 후 심상 반응에 따라 용량을 증가시킨다. 항콜린제제에 대한노인환상증후를 글라피페도트제제를 병용 투여하였을 때 심상과 심실수에 수반한 항콜린제제에 대한노인환상증후에 대한 보고가 있었다. 노노매지정심장근과 그 대용물제제에 대한노인환상증후 복약수칙 항콜린제제에 대한노인환상증후에 대한 보고가 있었다.

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 물질 유지면에서 비합리하지 않으므로 이점 주의한다.

포장단위】 자서포장단위

저장방법 및 사용기간 유통용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

본 약약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 냄새 또는 오수된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약품을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품에 대하여 자세한 정보를 원하시는 분은 소비자상담실 ☎031-377-7909로 문의하시기 바랍니다.

있는 곳에 보관해야 합니다

제 조 의 리 자 : 한국유토텍스(주) 경기도 화성시 향남읍 제ак공단3길 99
제 조 자 : (주)한국파마 경기도 화성시 향남읍 제ак공단3길 87

설명서 작성일 : 141210