

폴산(엽산) 결핍증의 예방 및 치료

일동 폴산^정 1mg

(Folic acid)

임산부와 태아를 위한
천연색소 폴산(엽산)제

일반의약품

분류번호

313 비타민B제(비타민B1을 제외)

원료약품의 분량(1정 중)

폴산(KP) 1.0mg

천연첨가물 : 치자황색소

성상

노란색의 원형 정제



효능·효과

1. 폴산결핍증의 예방 및 치료
2. 폴산의 수요가 증대하여 식사로부터 섭취가 불충분한 경우의 보급
소모성 질환, 임부·수유부
3. 악성빈혈의 보조요법(비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 빈혈 제외)
4. 다음 질환 중 폴산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 영양결핍성빈혈, 임신성빈혈, 소아빈혈
 - 2) 항전간제, 항말라리아제 투여로 인한 빈혈
5. 알콜중독 및 간질환에 관련된 거대적아구성빈혈

용법·용량

1. 폴산결핍증, 다른 약물 투여로 인한 결핍증 치료
성인 및 어린이 : 폴산으로서 1일 0.25~1 mg을 복용합니다.
2. 폴산결핍증 예방 및 폴산의 요구량이 증대하는 각종 질환
성인 및 어린이 : 이 약으로서 1일 0.1~0.25 mg을 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하십시오.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 또는 이 약에 포함된 성분예의 과민반응 환자
 - 2) 비타민 B₁₂ 결핍으로 인한 악성빈혈 또는 거대적아구성빈혈
 - 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

* 폴산 1141212

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 악성빈혈 환자(투여 시, 혈액상태는 개선되나 신경증상에는 효과가 없으므로 비타민 B₁₂ 제제를 병용(함께 복용)하십시오. 단, 진단이 확립되지 않는 악성빈혈 환자의 경우 혈액상태의 개선에 의해 악성빈혈을 은폐하여 진단 및 치료에 영향을 줄 수 있으므로 주의하십시오.)
- 3) 아미노살리실산, 경구용 피임제, 디하이드로폴레이트 환원효소 저해제(억제제)(메토포렉세이트, 트리메토프림 등)를 복용 중인 환자(바람직하지 않은 상호작용을 초래할 수 있습니다.)
- 4) 페니토인 같은 히단토인계 항간질제(항간질제)를 복용 중인 환자(페니토인의 혈중농도를 감소시켜 발작빈도를 증가시킬 수 있습니다.)
- 5) 설파살라진, 콜레스티라민을 복용 중인 환자(이 약의 위장관 흡수를 저해할 수 있습니다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 홍반(붉은 반점), 피부발진, 가려움증, 전신권태, 호흡곤란 등의 알레르기 증상
- 2) 식욕부진, 구역·구토, 부종(부기), 체중감소
- 3) 위장관장애, 수면변화, 집중부족, 과잉행동, 과민성, 흥분, 우울증, 혼란, 판단력 장애 등의 중추신경장애(고용량(1일 15mg 이상)에서 나타날 수 있습니다.)

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우 보호자의 지도·감독 하에 투여하십시오.
- 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 30정

- 포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 알루미늄 호일이 같이 따라오는 경우가 있으므로, 복용시 정제만 복용하시기 바랍니다.
- 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2014년 12월 12일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

(주)마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

제조의뢰자

일동제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우포로27길 2 (전화) 02-526-3114

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실: (전화)080-022-1010(수신자부담)