

전문약품	근육·정맥·피하주사
분류번호	03990

지씨치옥트산 주 티옥트산

GCTHIOCTICACID inj. Thioctic Acid

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

주 성 분: 티옥트산(EP) 5 mg
 pH조절제: 제삼인산나트륨(NF) 적량
 pH조절제: 인산수소나트륨이수화물(EP) 3.4 mg
 무통 화제: 벤질알코올(KP) 0.02 mL
 용 제: 주사용수(KP) 적량

【성상】

미황색의 투명한 액이 든 갈색앰플 주사제

【효능·효과】

티옥트산의 수요가 증대되는 경우의 보급(격심한 육체노동 시), Leigh증후군 (아급성괴사성뇌척수염), 중독성(스트렙토마이신, 가나마이신에 의한) 및 소음성 (직업성)의 내이성 난청
 1개월 정도의 투여로도 효과가 나타나지 않을 경우에는 지속적으로 사용하지 않는다.

【용법·용량】

티옥트산으로서 통상 성인 1일 1회 10 ~ 25 mg을 정맥내, 근육내 및 피하로 주사한다. 단, 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 앰플 주사제는 용기절단 시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의할 것.
- 벤질알코올은 조숙아에서 치명적인 가쁜 호흡증상과 연관이 있는 것으로 보고 되었다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

신생아, 미숙아(벤질알코올을 함유하고 있다.)

3. 이상반응

이 약은 사용성적조사 등 이상반응 발현빈도에 대한 명확한 조사가 실시된 바 없다.

- 소화기 : 식욕부진, 오심, 설사
- 기타 : 발진, 두통, 어지러움, 심계항진

4. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로, 감량하는 등 주의한다.

5. 적응상의 주의

이 약을 정맥내 주사 시 주사속도는 가능한 천천히 주사한다.

【저장방법】

차광밀봉용기, 실온보관 (1~30 ℃)

【포장단위】

5mL X 50 앰플

- ※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원, 도매상에 한하여 각 영업소에서 교환하여 드립니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성일자 (2016년 4월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencrosswb.com)나 소비자상담실 (031-629-8690)로 문의하시기 바랍니다.

제조 및 판매자 :

 **녹십자웰빙**

충청북도 음성군 금왕읍 무곡로65번길 26
 TEL:031)629-8600 소비자상담실 ☎031-629-8690