

소화성궤양 치료제

# 무코레바 정

## (레바미피드)

### 【원료약품 및 그 분량】1정 중

- 유효성분 : 레바미피드(KP).....100 mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 저치한도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성아산화규소, 히드록시프로필셀룰로오스, 전분글리콜산나트륨, 스타이리스산그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄, 탈크

### 【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

### 【효능·효과】

1. 위궤양
2. 다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선 : 급성위염, 만성위염의 급성악화기

### 【용법·용량】

성인 : 레바미피드로서 1회 100 mg을 1일 3회 경구투여한다. 다만, 위궤양의 경우에는 아침, 저녁 및 취침전에 투여한다.

### 【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
  - 이 약 성분에 과민반응 병력 환자
2. 이상반응
  - 여기서 '드물게'는 0.1 %미만을, '때때로'는 0.1 ~ 5 %미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5 %이상 또는 빈도불명을 의미함
  - 1) 중대한 이상반응
    - (1) 쇼크, 아나필락시스모양 증상(빈도불명) : 쇼크, 아나필락시스모양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
    - (2) 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
    - (3) 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
  - 2) 기타 이상반응
    - (1) 과민반응 : 두드러기, 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.
    - (2) 정신신경계 : 마비, 어지럼, 출혈이 나타날 수 있다.
    - (3) 소화기계 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
    - (4) 간 : 드물게 AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등 아미노전달효소가 현저히 상승한 경우나 발열, 발진 등이 동시에 나타난 경우는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
    - (5) 혈액계 : 혈소판 감소, 때때로 백혈구 분획증, 분열핵구의 감소, 림프구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소가 나타날 수 있다.
    - (6) 기타 : 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유방, 심계항진, 발열, 안면홍조, 허의 마비, 기침, 호흡곤란, 탈모 또는 드물게 월경이상, BUN 상승, 부종, 인두부 아물감 등이 나타날 수 있다.
3. 임부 및 수유부에 대한 투여
  - 1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되

는 경우에만 투여한다.

- 2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에 투여하는 경우에는 수유를 피한다.

### 4. 소아에 대한 투여

저체중출생아, 신생아, 유아, 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

### 5. 고령자에 대한 투여

고령자에 있어서 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비교령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.

### 6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

### 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

### 【포장단위】 30정/병, 300정/병

- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)-의약품 등 정보검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 최신의 정보 확인 방법 : 이 첨부문서 작성일 이후 변경된 내용은 홈페이지([www.guju.co.kr](http://www.guju.co.kr))에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : (02)2672-1122 제품문의 : 080-655-1414
- ※ 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약물안전관리원(Tel. 1644-6223)
- ※ 제조자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 효창구 정명면 덕철제기길 5

설령서 문인 최종 개정 연월일 : 2026. 02. 26

I-2601

