

지씨비타오 주

D-판테놀

GCVITAFIVE inj. D-Panthenol

【원료약품 및 그 분량】 1mL 중

주 성 분: D-판테놀(USP) 250 mg
 완 충 제: 시트르산수화물(KP) 1.4 mg
 용 해 제: 주사용수(KP) 적량

【성상】

무색~미황색의 액이 든 갈색앰플 주사제

【효능·효과】

1. 주효능 효과

- 1) 판토텐산결핍증의 예방 및 치료
- 2) 판토텐산의 수요가 증대하고 식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급 (소모성질환, 감작성기능항진증, 임부, 수유부 등)
- 3) 다음 질환 중 판토텐산의 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우: 스트렙토마이신 및 카나마이신에 따른 부작용의 예방 및 치료, 접촉피부염, 급 만성습진, 수술 후 장관 마비

【용법·용량】

성인: D-판테놀로서 1회 20~100mg 1일 1~2회 근육 또는 정맥주사한다.
 수술 후 장관마비에는 1회 50~500mg 1일 1~3회 투여하고 필요 시 6회까지 증가할 수 있다.
 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
 주사액의 조제: 정맥주사시는 이 약 500mg을 포도당주사액 또는 유산염 링겔용액 등의 정맥주사용액과 혼합하여 천천히 정맥내 주입한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

앰플 주사제는 용기 절단 시 유리파편이 혼입되어, 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용하되, 특히 어린이, 노약자 사용 시에는 각별히 주의할 것.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

혈우병 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

고혈압증후가 나타나면 투여를 중지한다.

4. 부작용

- 1) 피부: 가려움증, 타진통, 호흡곤란, 피부의 붉은 반점, 전신적 피부부, 두드러기가 나타날 수 있다.
- 2) 소화기계: 드물게 구토, 복통, 설사 등이 나타날 수 있다.
- 3) 호흡기계: 석사메토늄(succinylcholine) 투여의 중단 5분후 이 약 투여시 호흡곤란이 나타날 수 있다.
- 4) 순환기계: 가벼운 혈압저하가 나타날 수 있으며 노인에게서 약간의 홍분이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약은 직접 정맥내로 단독 투여할 수 없다. ('용법·용량' 항을 참조할 것)
- 2) 부교감신경흥분제(네오스티그민 등) 사용후에는 12시간, 또한 석사메토늄(succinylcholine) 투여 후에는 1시간의 간격을 두고 이 약을 투여하는 것이 바람직하다.

6. 상호작용

- 1) 드물게 항생물질, 마취제, 바르비탈계 약물과 병용투여시 원인불명의 알레르기반응이 보고되어 있다.
- 2) 이 약 투여로 여성에게 있어서 석사메토늄(succinylcholine)의 효과를 연장시키는 것으로 나타났다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다.

9. 기타

저칼륨혈증, 기계적 장폐색증 환자에는 임상효과를 얻을 수 없다.

【저장방법】

차광밀봉용기, 실온보관 (1~30 °C)

【포장단위】

2mL X 50 앰플

※ 유효기간 또는 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원, 도매상에 한하여 각 영업소에서 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2016년 4월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.greencrosswb.com) 나 소비자상담실 (031-629-8690)로 문의하시기 바랍니다.

제조 및 판매자 :

녹십자웰빙

충청북도 음성군 금왕읍 무극로65번길 26
 TEL:031)629-8600 소비자상담실 ☎031-629-8690