

테라미플러스 크림

25g

일반의약품

분류번호 : 02650
(가생성 피부질환용제)

참기 힘든 무좀·가려움·통증을 하루 한번으로 시원하게!

사용 전에 설명서를 주의깊게 읽어 보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

무좀은 곰팡이의 일종인 백선균이 피부각질층에 기생하여 발생하는 가장 흔한 피부진균(곰팡이) 감염증으로 수포(물집), 농포(고름물집), 가려움증, 통증 등 참기 어려운 다양한 증상을 수반하는 질환입니다. 심한 경우 각화(각질화)증 및 인설(비늘, 껍질) 등이 나타나기도 하는 만성적이고 재발적인 소양(가려움)성 질환입니다.

- * 테라미플러스 크림은 테르비나핀 복합 항진균(곰팡이)제로서 <무좀균> 및 그 <증상>을 효과적으로 개선시켜 줍니다.
- * 테라미플러스 크림은 4가지 유효성분을 배합하여 하루 한번 사용만으로도 가려움과 통증을 수반하는 무좀을 효과적으로 개선합니다.
- * 테라미플러스 크림은 피부에 도포 시(바를 시) 끈적이지 않으며 청량감을 더해줍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1g 중

• 테르비나핀염산염 (JP)	10.0mg
• 리도카인 (KP)	20.0mg
• 클리시리진산이칼륨 (KP)	5.0mg
• L-멘톨 (KP)	10.0mg
• 첨가제 (보존제)	
파라옥시벤조산메틸 (KP)	0.5mg
파라옥시벤조산프로필 (KP)	0.5mg

[성 상] 흰색 또는 거의 흰색의 특이한 냄새가 없는 전질균등한 크림제

[효능·효과] 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 무좀, 완선(사타구니백선), 백선

[용법·용량] 1일 1회, 적당량을 환부(질환 부위)에 도포한다(바른다).

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 이 약 성분에 의한 과민증(발진 및 부적, 가려움, 붓기 등)을 일으킨 적이 있는 사람
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
 - 유·소아
- 다음 부위에는 사용하지 말 것.
 - 눈이나 눈 주위, 점막(구강(입안), 비강(코안), 질 등), 음낭, 외음부 등
 - 습진
 - 습윤(습기 참), 짓무름, 갈라짐이나 외상(상처)이 심한 환부(질환 부위)
 - 손톱, 두피
- 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.

이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 약에 의해 알레르기 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 본인 또는 가족이 알레르기체질인 사람
 - "습진" 인지 "무좀, 완선(사타구니 백선), 백선" 인지 확실하지 않은 사람(음낭에 가려움 및 짓무름 등의 증상이 있는 경우는 습진 등의 다른 원인에 의한 경우가 많다)
 - 환부(질환 부위)가 안면(얼굴) 또는 광범위한 사람
 - 환부(질환 부위)가 화농(농)으로 되어 있는 사람

참기 힘든 무좀·가려움·통증을
하루 한번으로 시원하게!

테라미플러스 크림

- 다음의 경우는 즉시 사용을 중지하고, 이 설명서와 함께 의사 또는 약사와 상담할 것.
 - 사용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우

관계부위	증상
피부	발진 및 발적(총혈 되어 붉어짐), 가려움, 붓기, 자극감, 열감, 인비늘, 낙설(비듬이나 대와 같은 피부의 벗겨짐), 짓무름, 피부건조 및 피부가 당겨지는 느낌, 피부의 갈라짐

- 2주일 정도 사용하더라도 증상이 좋아지지 않는 경우나 본 약제의 사용에 의해 증상이 악화된 경우
- 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 정해진 용법 및 용량을 엄수할 것
 - 환부(질환 부위)나 그 주위가 더러워진 채로 사용하지 말 것
 - 본 약제가 묻은 손으로 눈이나 점막을 만지지 말 것
 - 눈에 들어가지 않도록 주의할 것. 만일, 눈에 들어간 경우에는 즉시 찬 물 또는 미지근한 물로 씻어내고, 즉시 안과의의 진료를 받을 것.
 - 이 약은 외용에만 사용할 것
 - 테르비나핀염산염 크림제는 모로르트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.
- 저장상의 주의사항
 - 직사광선이 닿지 않는 서늘한 곳에 밀봉하여 보관할 것
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것 (오용(잘못 사용)의 원인이 되거나 품질이 바뀌는 경우가 있다)
 - 사용기한이 지난 제품은 사용하지 말 것. 그리고 사용기한 내이더라도 개봉 후에는 최대한 빨리 사용할 것(품질유지를 위해)

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사 포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입한 약국을 통해 교환하여 드립니다.
- * 본 설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.
- * 내용 외 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청으로 연락하시고, 의약품용어설명 및 정보는 "온라인의약품도서관(drug.mfds.go.kr) 의약품 정보 참조"

제조의뢰자 : 초당약품공업(주) 경기도 안산시 단원구 별망로 381

제 조 자 : 시믹씨엠오코리아(주) 경기도 부천시 원미구 옥산로 230번길 23

■ 제품문의 : 080-302-3000 (수신자 부담) www.chodang.com

작성 연월일 : 2015.01.23

변경 연월일 : 2016.01.21