

티트로신 겔

(티로트리신)

【원료약품 및 그 분량】 1g 중

- 유효성분 : 티로트리신(KP) 1.0mg(역가)
- 첨가제(보존제) : 세틸피리디늄염화물수화물(USP) 0.5mg
- 기타 첨가제 : 에탄올, 정제수, 카보머940, 트로메타민, 프로필렌글리콜

【성상】 무색의 투명한 겔

【효능 · 효과】 감염의 우려가 있거나 감염된 외상(상처), 화상, 굼은 피부감염, 하지(다리)족부 궤양에서의 피부진균(곰팡이)감염, 습진에서의 2차감염, 입술포진(입술물집)

【용법 · 용량】 감염된 부위에 하루 2~3회 적당량을 바른다.

가벼운 상처나 점막 부위의 감염에는 드레싱이 필요하지 않다. 광범위한 질한 부위 및 심한 삼출성 상처에는 드레싱이 권장되며 제품을 1~2회 사용시마다 드레싱을 교체하는 것이 권장된다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람(신체 부위)에는 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 3) 코점막 부위
2. 이 약을 사용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
 - 1) 이 약의 주성분과 보존제가 모두 중으로 분비된다고 알려져 있으므로 이 약을 사용하는 동안 수유하거나 수유하는 동안 이 약을 사용하지 않는다.
 - 2) 눈에 직접 닿으면 화끈감이 나타날 수 있으므로, 눈 주위에 사용할 경우 이 약이 눈에 직접 닿지 않도록 주의한다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
이 약에 포함된 프로필렌글리콜에 과민반응의 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 피부 화끈감 등의 과민반응
 - 2) 이 약을 사용한 후 증상이 악화되거나, 일주일 이상 사용하여도 증상의 개선이 없는 경우
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 오용(잘못 사용) · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
 - 3) 제품 개봉 후 3개월 이내에 사용할 것.

【저장방법】 기밀용기, 25℃이하 보관

【포장단위】 10g/튜브 【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질 · 변패 · 오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)