

도미다 프리미엄^정

일반의약품 / 분류번호 : 03190

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

L-시스테인(JP)	60mg
제피아스쿠르브산(별규)	260.4mg
(아스쿠르브산으로 250mg)	
판토텐산칼슘(KP)	12mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	100mg
(비타민E로서 50I.U.)	
피리독신염산염(KP)	3mg
리보플라빈(KP)	6mg
γ-오리자놀(KP)	10mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)

【성상】 흰색 내지 흰색에 가까운 정방형 필름코팅정

【효능·효과】 다음 경우의 비타민 E, B₂, B₆, C의 보급

- 육체 피로
- 임신·수유기
- 노년기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 경련기 시 다음 증상의 완화 : 어거·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 햇빛, 피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
 - 잇몸출혈, 비출혈(코피) 예방

【용법·용량】 성인 및 만 12세 이상 1일 2회, 만 8세 이상 ~ 만 12세 미만 1일 1회, 1회 1정씩 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산이 배설되는 상태)
 - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 통풍 환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
 - 우발적으로 과량 복용한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장 방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장 단위】 60정, 180정

【사용 기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

DMP01-E01-01

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 04. 03

제조사
JS제이에스제약(주)
전남 장성군 황룡면 강변로 484-28
소비자 상담전화 : (061)394-5530

판매자
태극제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123