

## 【원료약품 및 그 분량】 1정 중

트리메부틴말레산염(KP) ..... 100mg

첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소,우유)

【성상】 흰색의 원형 정제

【효능·효과】

### 1. 주효능 효과

- 1) 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
- 2) 과민성대장증후군 및 경련성 결장
- 3) 소아 질환: 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과 장애 (변비, 설사), 동요(안절부절)자극, 수면장애

【용법·용량】

성인: 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg(1~2정) 1일 3회 식전에 경구투여(복용)한다. 연령(나이), 증상에 따라 적절한 증감한다.

【사용상의 주의사항】

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

### 2. 이상반응

- 1) 소화기계: 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목마름), 구내(입안)마비감 등이 나타날 수 있다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
- 3) 정신신경계: 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장: 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
- 5) 과민증: 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.

### 3. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(우돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

### 4. 수유부에 대한 투여

수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유 중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 의약품은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.

※ 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)-(의약품 검색)을 참조하십시오.