

레스타정

10mg
20mg

(루바스타틴칼슘)

【원료약품 및 병량 : 1정 중】

- 레스타정 10mg
루바스타틴칼슘(별규) 10.4mg (루바스타틴으로서 10mg)
첨가제(동물유래성분): 유당수화물(건강한 소의 우유)
- 레스타정 20mg
루바스타틴칼슘(별규) 20.8mg (루바스타틴으로서 20mg)
첨가제(동물유래성분): 유당수화물(건강한 소의 우유)

【성 상】

- 레스타정 10mg : 분홍색 원형 필름코팅정
- 레스타정 20mg : 분홍색 원형 필름코팅정

【효소·효과】

1. 원발성 고콜레스테롤혈증(type Ila).
복합형 고지혈증(type IIb) : 식이 및 운동으로 조절이 안 될 경우 식이요법의 보조제
2. 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 식이요법이나 다른 지질저하요법에 LDL 분리분출법의 보조제
3. 고콜레스테롤혈증 환자에서 총콜레스테롤과 LDL-콜레스테롤을 목표 수준으로 낮추어 죽상동맥경화증의 진행을 지연
4. 열발성 이상테타르포로테인혈증(type IIb) 및 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 약을 투여한 뒤 투여중인 환자는 표준 콜레스테롤을 저하시킬 수 있어야 하며, 이를 치료기간동안 지속하여야 한다. 식사와 상관없이 하루 중 아무때나 이 약을 투약할 수 있다. 초최용량은 1일 1회 5밀리그램이며, 더 많은 LDL-콜레스테롤을 감소시켜야 할 경우 유지용량으로 조절하여 투여할 수 있다. 유지용량은 1일 1회 10밀리그램으로 대부분의 환자는 이 용량에서 조절된다. 유지용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤을 수치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절하여야 하며, 1일 최대 20밀리그램까지 증감할 수 있다.
2. 노인 : 용량조절이 필요하지 않다.
3. 신부전환자 : 경증 및 중등도 신부전 환자의 경우 용량을 조절할 필요가 없다. 중증의 신부전 환자에는 투여하지 않는다. 중등도 신부전 환자에게 이 약 20mg 투여시 각별히 주의해야 한다.
4. 간부전환자 : Child-Pugh 점수가 7 이하인 경우에는 루바스타틴의 전신 노출 증가가 나타나지 않았으나, Child-Pugh 점수가 8 또는 9인 환자에서는 증가하였다. 이러한 환자에서는 신기능 검사가 고려되어야 한다. Child-Pugh 점수가 9를 초과하는 환자에 대한 투여 경험은 없다. 활동성 간질환 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.
5. 인종 : 아시아계 환자들에게 이 약의 전신노출이 증가하기 때문에, 권장 초기 용량은 5밀리그램이다. 40밀리그램 용량 투여는 금기이다.
6. 근병증에 걸리기 쉬운 환자 : 근병증에 걸리기 쉬운 환자들의 권장 초기 용량은 5밀리그램이다. 이러한 환자를 중 및대용량에 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이다.

【용법·용량】

1. 원발성 고콜레스테롤혈증(type Ila), 복합형 고지혈증(type IIb) 원발성 이상테타르포로테인혈증(type IIb) 및 동형접합 가족성 고콜레스테롤혈증에 약을 투여한 뒤 투여중인 환자는 표준 콜레스테롤을 저하시킬 수 있어야 하며, 이를 치료기간동안 지속하여야 한다. 식사와 상관없이 하루 중 아무때나 이 약을 투약할 수 있다. 초최용량은 1일 1회 5밀리그램이며, 더 많은 LDL-콜레스테롤을 감소시켜야 할 경우 유지용량으로 조절하여 투여할 수 있다. 유지용량은 1일 1회 10밀리그램으로 대부분의 환자는 이 용량에서 조절된다. 유지용량은 4주 또는 그 이상의 간격을 두고 LDL-콜레스테롤을 수치, 치료목표 및 환자의 반응에 따라 적절히 조절하여야 하며, 1일 최대 20밀리그램까지 증감할 수 있다.
2. 노인 : 용량조절이 필요하지 않다.
3. 신부전환자 : 경증 및 중등도 신부전 환자의 경우 용량을 조절할 필요가 없다. 중증의 신부전 환자에는 투여하지 않는다. 중등도 신부전 환자에게 이 약 20mg 투여시 각별히 주의해야 한다.
4. 간부전환자 : Child-Pugh 점수가 7 이하인 경우에는 루바스타틴의 전신 노출 증가가 나타나지 않았으나, Child-Pugh 점수가 8 또는 9인 환자에서는 증가하였다. 이러한 환자에서는 신기능 검사가 고려되어야 한다. Child-Pugh 점수가 9를 초과하는 환자에 대한 투여 경험은 없다. 활동성 간질환 환자에게는 이 약을 투여하지 않는다.
5. 인종 : 아시아계 환자들에게 이 약의 전신노출이 증가하기 때문에, 권장 초기 용량은 5밀리그램이다. 40밀리그램 용량 투여는 금기이다.
6. 근병증에 걸리기 쉬운 환자 : 근병증에 걸리기 쉬운 환자들의 권장 초기 용량은 5밀리그램이다. 이러한 환자를 중 및대용량에 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자
 - 2) 원인 불명의 지속적인 혈청 트랜스아미나제 상승 또는 정상 상한치의 3배를 초과하는 혈청 트랜스아미나제 상승을 포함하는 활동성 간질환 환자
 - 3) 근병증환자
 - 4) 사이크로스포린 병용투여 환자
 - 5) 중증의 신부전의 신장에 환자 (creatinine clearance (CL_{Cr}) 30ml/min)
 - 6) 임부 및 수유부, 적절한 피임을 방법을 사용하지 않는 가임여성 출산이 가능한 연령의 여성에 이 약을 투여시 임신하지 않을 가능성이 높은 경우와 태아에 대한 잠재적인 위험성에 대해 알려주었을 때만 투여한다.
 - 7) 근병증/황문근용해증에 걸리기 쉬운 환자들에게 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이다. 이러한 인자들은 아래와 같다.
 - 중등도의 신장에 (크레아티닌 청소율 : 60ml/min)
 - 갑상선기능저하증
 - 유전적인 근질환 병력 또는 가족력이 있는 경우
 - 다른 HMG-CoA 환원효소 또는 피브레이트 계열 약물에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
 - 알코올 중독
 - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
 - 아시아계 환자
 - 피브레이트 계열 약물 병용투여
 - 8) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다(임용 함유 제제에 한함)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 이 약은 알코올을 과다 섭취하거나 간 질환의 병력이 있는 환자에서 투여시 주의해야 한다. 이 약 투여 시작 전 및 그 후 임상적 필요에 따라 반복하여 간효소 검사를 실시할 것을 권고한다. 갑상선기능저하증이나 신중후군에 의한 2차적 고콜레스테롤혈증 환자는 이 약을 투여하기 전에 원인 질환을 치료해야 한다.
 - 2) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 골격근에 대한 효과, 예를 들면, 합병증으로 설명되지 않는 근육통 및 근병증, 드물게 황문근용해증이 이 약을 투여받은 환자에서 보고되었다.
 - 3) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 근병증/황문근용해증에 걸리기 쉬운 요인을 갖고 있는 다음의 환자에서는 치료의 위험성과 유익성이 고려되어야 하며, 임상 모니터링이 권장된다. 치료전 CK(Creatine kinase) 값이 기저수준에서 유익성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가되어 있는 경우) 치료를 시작해서는 안된다.
 - 신장질환자
 - 갑상선기능저하증

- 유전적인 근질환의 병력 또는 가족력이 있는 경우
 - 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제 또는 피브레이트에 대한 근육 독성의 병력이 있는 경우
 - 알코올 남용
 - 70세 이상의 노인
 - 혈장 농도가 증가할 수 있는 상황
 - 피브레이트 계열 약물 병용투여
1. 치료 중에는 특히 권태감이나 열과 관련이 있을 경우, 다른 이유로 설명되지 않는 근육통이나 근육쇠약, 경련을 즉시 보고해야 한다. 이러한 환자에서 CK 값을 측정해야 하고 이때 CK치가 현재치 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가), CK치가 정상 상한치의 5배 이하로 증가한다 할지라도 근육 증상이 심하고 일상의 불편함을 야기한다면 이 약의 투여를 중단해야 한다. 증상이 해결되고 CK치가 정상으로 돌아가면 면밀한 모니터링과 함께 이 약 또는 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제를 최저 용량으로 재시작할 것을 고려해야 한다. 무증상인 환자에서 일반적인 CK치의 모니터링은 필요하지 않다.
 2. 측정 결과와 해석을 어렵게 할 수 있으므로 격렬한 운동 후나 CK값을 증가시킬 수 있는 기타 원인이 있는 경우는 CK를 측정하지 않도록 한다. CK값이 기저상태에서 유익성있게 증가(정상 상한치의 5배 이상 증가한 경우 5~7배)된 환자에서 투여하여야 한다. 시험 반복시에도 기저상태의 CK 값이 정상 상한치의 5배 이상 증가한 경우 이 약을 투여하지 않는다.
 - 3) 근병증이나, 황문근용해증에 부차적인 신부전으로 악화될 것을 염두에 두는 금식 중증 상태(예를 들면, 패혈증, 저혈당, 대수소, 창상, 중증의 대장성/내분비성/전해질실질 질환, 조절되지 않는 간질환)에서는 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - 4) 임상시험에서 이 약과 다른 약을 병용 투여한 소수의 환자에서 골격근에 대한 효과가 증가된 증가는 없다. 그러나 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 피브린산 유도제(케미프린, 사이크로스포린, 니코틴산, azole계 항진균제, protease 저해제, macrolide 항생제를 투여받은 환자에서 근염과 근병증의 빈도가 증가했다. 케미프로실은 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용시 근병증의 위험을 증가시킨다. 따라서 이 약과 케미프로실의 병용은 추천되지 않는다. 이 약을 피브레이트나 니아신과 병용투여시 유익성과 위험성을 주의 깊게 평가하여야 한다. 피브레이트 계열 약물과 병용투여할 때 이 약 40밀리그램 용량은 금기이다.
 - 5) 고지방 특히 40mg 용량 환자에서, dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었다. 이것은 일반적으로 일시적이고 금식 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아니다. 40mg 투여 환자의 추적 기간동안에는 신기능 검사를 고려하여야 한다.
 - 6) 약독학 시험에 의하면 코카서인인과 비코시 아시아인에서 전신 노출의 증가(AUC 및 C_{max}의 중앙값이 약 2배 증가)가 나타났으므로 아시아인에게 용량결정시 이러한 사항을 고려하여야 한다.
 - 7) 만 10-만 17세의 소아환자 : 루바스타틴을 복용한 소아 환자에서, Tanner staging에 의한 이차 성징 및 성형 성장(키, 체중, BMI(body mass index)의 평가는 1년으로 제한적이다.
3. 이상반응
 - 1) 보고된 이상반응은 일반적으로 경미하고 일시적이었다. 이상반응으로 연구를 중단한 환자는 이 약 투여군중 4% 미만이었다. 이상반응의 발현빈도는 다음과 같이 분류하였다:
 - 흔하게 (1/100, 1/10):
 - 흔하지 않게 (1/1,000, 1/100):
 - 드물게 (1/10,000, 1/1,000):
 - 매우 드물게 (1/10,000).알려지지 않은 (활동할 수 있는 자료로부터는 추정할 수 없다.)
 - 2) 골격근에 미치는 영향 : Dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 ++ 이상으로 전환되는 현상이 10, 20밀리그램에서는 18%이며, 40밀리그램에서는 약 3%에서 나타났다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 ++로 약간 증가하는 것도 20밀리그램 용량에서 관찰되었다. 단백뇨는 대부분의 경우 치료 도중 감소하거나 자발적으로 사라졌으며 금식 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아니다. 이 약을 투여한 환자 및 임상시험환자에서 혈뇨가 관찰되었으나, 발현빈도는 낮았다.
 - 3) 근육격격에 미치는 영향 : 금식 신부전과 함께 또는 금식 신부전 없이 근육격격에 미치는 영향에 : 근육통, 근육병증(근육염 포함), 드물게 황문근용해 증 등이 이 약 모든 용량의 치료환자(특히 20밀리그램 이상에서) 보고되었다. 루바스타틴을 투여받은 환자군에서 creatine kinase(CK) 수치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다. creatine kinase(CK) 수치가 현재치 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가하는 경우) 일시적으로 치료를 중단하여야 한다.
 - 4) 간에 미치는 영향 : 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 이 약을 투여받은 소수의 환자에서 트랜스아미나제치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다.
 - 5) 국외의 경우 경험
 - 위의 이상반응에 대하여 다음의 이상반응이 시판 후 조사된 보고되었다.
 - 신경계 : 매우 드물게 다발성신경병증, 기억상실
 - 호흡기계 및 흉부 : 기침, 호흡곤란 (빈도 불명)
 - 위장관계 : 설사(빈도 불명)
 - 간담도계 : 매우 드물게 황달, 간염, 드물게 트랜스아미나제 증가
 - 피부 및 피하조직 상태 : 스티븐스-존슨 증후군(빈도 불명)
 - 근육격격 : 매우 드물게 관찰됨

발현빈도	증상별 발현빈도		
	흔하게	흔하지 않게	드물게
면역계			혈관부종을 포함한 과민 반응
내분비계	당뇨병		
신경계	두통, 어지러움		
위장관계	변비, 구역, 복통		췌장염
피부 및 피하조직		가려움증, 발진 및 두드러기	
근골격계 및 결합조직	근육통		근육병증 (근육염 포함) 황문근용해증
전신	무력증		

- 주1 : JUPITER 임상시험에서 금식시 혈당이 5.6 ~ 6.9 mmol/L 환자에서 가장 많이 보고된 이상반응(루바스타틴 투여군 2.8%, 위약군 2.3% 보고) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로 용량 증가에 따라 이상반응이 증가하는 경향이 나타났다.
- 2) 신장에 미치는 영향 : Dipstick 테스트에 의해 검출되는 대부분이 세뇨관 기원인 단백뇨가 관찰되었다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 ++ 이상으로 전환되는 현상이 10, 20밀리그램에서는 18%이며, 40밀리그램에서는 약 3%에서 나타났다. 노년백이 음성 또는 극소량에서 ++로 약간 증가하는 것도 20밀리그램 용량에서 관찰되었다. 단백뇨는 대부분의 경우 치료 도중 감소하거나 자발적으로 사라졌으며 금식 또는 진행성 신부전의 예측 인자는 아니다. 이 약을 투여한 환자 및 임상시험환자에서 혈뇨가 관찰되었으나, 발현빈도는 낮았다.
- 3) 근육격격에 미치는 영향 : 금식 신부전과 함께 또는 금식 신부전 없이 근육격격에 미치는 영향에 : 근육통, 근육병증(근육염 포함), 드물게 황문근용해 증 등이 이 약 모든 용량의 치료환자(특히 20밀리그램 이상에서) 보고되었다. 루바스타틴을 투여받은 환자군에서 creatine kinase(CK) 수치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다. creatine kinase(CK) 수치가 현재치 상승되거나(정상 상한치의 5배 이상 증가하는 경우) 일시적으로 치료를 중단하여야 한다.
- 4) 간에 미치는 영향 : 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 이 약을 투여받은 소수의 환자에서 트랜스아미나제치가 용량 의존적으로 증가하였다. 대부분의 경우 경미하고 무증상이었으며 일시적이었다.
- 5) 국외의 경우 경험
 - 위의 이상반응에 대하여 다음의 이상반응이 시판 후 조사된 보고되었다.
 - 신경계 : 매우 드물게 다발성신경병증, 기억상실
 - 호흡기계 및 흉부 : 기침, 호흡곤란 (빈도 불명)
 - 위장관계 : 설사(빈도 불명)
 - 간담도계 : 매우 드물게 황달, 간염, 드물게 트랜스아미나제 증가
 - 피부 및 피하조직 상태 : 스티븐스-존슨 증후군(빈도 불명)
 - 근육격격 : 매우 드물게 관찰됨

- 신장 : 매우 드물게 혈뇨
 - 기타 : 부종 (빈도 불명)
- 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 다음과 같은 이상반응이 보고된 바 있다.
- 정신경계 : 우울증, 수면장애(불면 및 악몽 포함)
 - 호흡기계 : 특히 장기투여시 간질성 폐질환과 같은 예외적 사례
 - 비노생식기계 : 성적 기능이상
 - 간담도계 : 치명적 및 비치명적 간부전
- 스타틴 사용과 관련하여 사후 후 인지장애가 드물게 보고되었다. (예, 기억력 감퇴, 간명증, 기억상실증, 기억장애, 혼동) 이러한 인지장애는 모든 스타틴 계열 약물에서 보고되었다. 이러한 보고들은 일반적으로 심각하지 않고 약물 사용중단 후 가역적이며, 증상발생 시점(일~수) 및 뇌 중성지방 선종간값이 3주는 편차가 있다.
- 6) 국내 사후 후 조사 결과
- 국내에서 제1차사후 유해사 6년 동안 3,081명을 대상으로 실시한 사용성적 조사 결과 인과관계에 상관없이 유해사례 발현율은 10.06%(310명, 415건)로 주로 두통 0.79%(24명, 24건), 어지러움 0.75%(23명, 23건), ALT 증가 0.55%(18명, 18건), 가슴통증, 기침, 근육통이 각각 0.49%(15명, 15건)로 보고되었다. 이 중 이 약물과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응은 2.92%(90명, 106건)이다.
- 보고된 약물유해반응으로는 ALT 증가가 0.55%(17명, 17건)로 가장 많았고 근육통 0.42%(13명, 13건), 두통 0.39%(12명, 12건), CK 증가 0.29%(9명, 9건), 어지러움 0.26%(8명, 8건), 변비, AST 증가가 각각 0.16%(5명, 5건), 무력증, 관절통증이 각각 0.13%(4명, 4건), 피로, 무감각이 각각 0.10%(3명, 3건), 감각이상, 가슴불편함, 구역, 복통, 설사, 식욕부진, 복부팽만, 가려움증, 간 기능검사이상이 각각 0.06%(2명, 2건), 실신, 전신통증, 근육경련, 등통, 팔 거부증이 각각 0.03%(1명, 1건) 순으로 나타났다. 이 중 1명에서 나타난 근육통, 관절통증은 종대한 약물유해반응이었으며, 사후 전에 나타나지 않았던 예상하지 못한 약물유해반응으로는 관절통증 0.13%(4명, 4건), 피로, 무감각이 각각 0.10%(3명, 3건), 감각이상, 가슴불편함, 식욕부진, 복부팽만, 간기능검사이상이 각각 0.06%(2명, 2건), 실신, 전신통증, 근육경련, 등통, 팔 거부증이 각각 0.03%(1명, 1건)으로 나타났다. 종대하고 예상하지 못한 약물유해반응으로 관절통증이 1건 보고되었다.
- 제1차사 기간 동안 지발적으로 보고된 유해사례가 98건이 있었으며, 이 중 종대하고 예상하지 못한 약물유해반응으로 급성신부전이 2건, 폐노, 혈소판 감소증, 혈중크레아티닌증가가 각각 1건씩 보고되었다.
- 7) 만 10 ~ 만 17세의 소아환자
- 만 10 ~ 만 17세의 소아환자를 대상으로 실시한 52주 동안의 임상시험에서 중등 및 중가된 신체 활동 후 정상 범위의 상한치 10배를 초과하는($10 \times \text{U/L}$) creatinine kinase 수치 상승이 성인 환자에 비해 좀 더 빈번하게 관찰되었다. 다른 사항에 대해 소아환자의 안전성 프로파일은 성인과 유사하였다.
4. 일반적 주의
- 1) 간질성 폐질환 : 일부 스타틴계열 약물과 관련하여 특히 장기 투여시 간질성 폐질환과 같은 이례적인 사례가 보고된 바 있다. 발현되는 양상으로는 호흡곤란, 기가 없는 기침 및 일반적인 건강의 악화(피로, 체중감소 및 발열)가 포함될 수 있다. 환자가 간질성 폐질환으로 발전이 의심될 경우에는 스타틴 약물 치료를 중단하여야 한다.
 - 2) 이 약을 포함한 스타틴 계열 약물을 복용한 환자에서 치명적 및 비치명적 간부전 관련 사후유 사례들이 드물게 보고되었다. 이 약 투여 중 임상적 증상이 없는 심각한 간손상 및/또는 고빌리루빈혈증 또는 황달이 발생한 경우 즉시 치료를 중단한다. 다른 병인이 발견되지 않은 경우 이 약을 재투여하지 않는다.
 - 3) 동 제제를 포함한 HMG-CoA 환원효소 억제제 투여시 HbA_{1c} 및 공복 혈당 수치 증가가 보고되었다.
 - 4) 당뇨병 : 향후 당뇨병이 발생할 위험성이 높은 몇몇 환자들에게서 적절한 당뇨병 치료를 요하는 과혈당증을 유발할 수 있다는 몇 가지 증거가 제시되었다. 그러나 스타틴 제제의 혈당상 위험성 감소효과는 이러한 위험성을 상회하므로 스타틴 치료 중단이 사유가 될 수 없다. 위험성이 있는 환자(공복혈당 5.6~6.9 mmol/L, BMJ)30kg/m², 중성지방수치 상승, 고혈압들은 진료처침에 따라 임상적 및 실험실적 수치 모니터링을 실시해야 한다. JUPITER 연구에서 공복혈당이 5.6~6.9 mmol/L인 환자들에게서 보고된 당뇨병 발생 총빈도는 로수바스타틴투여군에서 2.8%, 위약군에서 2.3%이었다.
5. 상호작용
- 1) 다른 HMG-CoA 환원효소 저해제와 마찬가지로, 비타민K 길항제(예:와파린)를 병용투여하는 환자에서 이 약으로 치료를 시작하거나 이 약의 용량을 증가시킬 경우, INR이 증가될 수 있다. 이 약을 중단하거나 용량을 감소시키면 INR이 감소될 수 있다. 이 경우, 적절한 INR 모니터링이 권장된다.
 - 2) 사이크로스포린과 병용시 로수바스타틴의 혈장 농도가 건강한 지원자보다 평균 7배 증가되었다. 로수바스타틴과 사이크로스포린의 병용투여는 사이크로스포린의 혈중농도에 영향을 미치지 않는다.
 - 3) 겐미피로마이신 로수바스타틴의 최고혈중농도와 AUC가 2배 증가하였다. 특정한 상호작용 자료에서 페노피브레이트와 약물동태학적 관련 상호작용은 없으며, 약물동태학적 상호작용은 발생할 수 있다. 겐미피로질, 페노피브레이트, 다른 피브레이트 계열 약물 및 지질저하용량(일 1g 이상의 니코틴산은 단독투여했을 때 근병증을 일으킬 수 있기 때문에, HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용투여했을 때 근병증 위험성을 증가시킨다, 피브레이트 계열 약물을 병용투여할 때 이 약 40밀리그램 용량 투여는 금기이며, 투여 초기 용량으로 5밀리그램을 투여해야 한다.
 - 4) 수산화알루미늄, 수산화마그네슘을 함유하는 제산제와 이 약을 병용 투여한 결과, 로수바스타틴의 혈장 농도가 약 50% 감소되었다. 그러나 이 효과는 제산제를 이 약 투여 2시간 후에 투여했을 때에 완화되었다. 이 상호작용의 임상적 관련성은 연구되지 않았다.
 - 5) 성체내 ·의 시험 결과, 로수바스타틴은 cytochrome P450 동위효소의 저해제나 유도제가 아니다. 또한 로수바스타틴은 이러한 동위효소에 대한 좋은 기질이 아니다. 로수바스타틴과 플루코나졸(CYP2C9, CYP3A4의 저해제) 또는 케토코나졸(CYP2A6, CYP3A4의 저해제) 사이의 상호작용은 관찰되지 않았다. 이트라코나졸(CYP3A4의 저해제)과 병용투여시 로수바스타틴의 AUC가 28% 증가하였으나 이러한 증가는 임상적인 의미가 없는 것으로 생각된다. 따라서 cytochrome P450 매개제 대사에서 유래하는 약물 상호작용은 일어나지 않을 것으로 예상된다.
 - 6) 상호작용 시험에 근거할 때 다국산, 페노피브레이트와 임상적으로 유의한 상호작용은 없다. 겐미피로질, 다른 피브레이트, 니아신의 지질 저해용량(1g/일 이상)과 HMG-CoA 환원효소 저해제와 병용 투여시 근병증의 위험을 증가시킬 수 있는데 이는 아마도 이 약물들이 아마도 단독 투여시에 근병증을 야기할 수 있기 때문이다.
 - 7) 에리스로마이신과 병용시 로수바스타틴의 AUC(0-4)가 20% 감소되고, 최고혈중농도가 30% 감소되었다. 이러한 상호작용은 에리스로마이신에 의한 장 운동성 증가에 의해 야기될 수 있다.
 - 8) 경구용 피임제와 병용투여시, ethinyl oestradiol과 norgestrel의 AUC가 각각 26%, 34% 증가되었다. 경구용 피임제의 용량 선택시 이러한 혈장 농도의 증가를 고려하여야 한다. 이 약물과 HRT를 병용하는 환자의 약동학 자료

- 가 없으므로 유사한 효과를 배제하여서는 안된다. 임상시험시 여성에서 병용 투여가 많았으며 내약성은 우수하였다.
- 9) 단백질분해효소 저해제 : 비록 정확한 상호작용 기전이 밝혀지지 않았으나, 단백질분해효소 저해제는 이 약의 효능을 강하게 증가시킬 수 있다. 건강한 피험자를 대상으로 한 약물동태시험에서 이 약 20밀리그램 용량과 두 개의 단백질분해효소억제제 (로카바아 400밀리그램 / 리토나비어 100밀리그램)을 병용투여했을 때 이 약의 혈장상태 AUC(0-24) 및 최고혈중농도를 각각 2배 및 5배 증가시킨다. 그러므로, 단백질분해효소 저해제를 투여받는 HIV/환자들에게 이 약을 병용투여하는 것은 권장되지 않는다.
 6. 일부 및 수유부에 대한 투여
- 임신 및 수유부에 대한 이 약의 안전성은 확립되지 않았으므로 임신 또는 수유중에 사용하면 안된다.
- 임신 가능성이 있는 여성은 적절한 피임법을 사용해야 한다. 폴레스테를 및 폴레스테를 합성상 산물이 태아의 발달에 있어 필수적이므로 HMC-CoA 환원효소를 저해하여 발생하는 잠재적 위험성이 임신 중 치료하여 알게 되는 유익성을 상회한다. 동물시험에 의하면 제한된 생식독성의 증거가 있다. 이 약을 사용하는 동안 임신을 할 경우 즉시 복용을 중단해야 한다. 로수바스타틴은 젖의 모유로 이행된다. 사람에서의 모유로의 이행에 대한 데이터는 없다.
7. 과량투여시의 처치
- 과량 투여시 특별한 처치 방법은 없다. 과량 투여 시에는 대증요법 및 보조 치료가 행해져야 한다. 간기능 및 CK치를 모니터링 해야 한다. 혈액 투석은 도움이 되지 않는 것으로 보인다.
8. 적응상의 주의
- 이 약이 특성이 있는 여성은 적절한 피임법을 사용해야 한다. 사후에 수행되지 않았으나 약역학적 분석에 근거할 때 영향을 미치는 것은 알려진 바 없다. 운송이나 기계작동시 이 약 투여로 인하여 어지러울 수 있음을 고려하여야 한다.
9. 기타
- 1) 일반약리시험, 반복투여독성시험, 유전독성시험, 발암성시험에 근거한 전임상 자료에 의하면 사람에게 대한 특별한 위험은 없다. 젖의 출생 전후 발생시험에서, 동복자 크기 감소, 동복자 무게 감소, 체체대 생중 감소 등 생식 독성이 나타났다. 이러한 효과는 치료 용량의 수배에 해당하는 용량을 모체에 전신 투여하였을 때 나타났다.
 - 2) 약동학 시험에 의하면 아시아인(일본, 중국, 필리핀, 베트남, 한국에서 코카시아인과 비교)시 AUC 및 C_{max}중앙값이 약 2배 증가하였다. 인구학적 약동학 분석에 의하면 코카시아인과 흑인간에 임상적으로 의미있는 약동학 차이는 없었다.
- 【저장방법】
- 레스타팅 10mg : 기밀용기, 실온 (~30℃) 보관
 - 레스타팅 20mg : 기밀용기, 실온 (~30℃) 보관
- 【포장단위】 자사포장단위(100정)
- 【사용기간】 제조일로부터 24개월

- ※ 자세한 목록허가 또는 신고사항은 온라인약도서전(<http://drug.mks.go.kr>)의 약약품 정보 참조
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.
- ※ 사용기간이 지난 약약품은 사용하지 마십시오.
- ※ 약품을 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의하십시오.
- ※ 본 약약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 약약품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태, 오염 또는 손상된 약약품은 약국개설자 및 약약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다. ♣ 080-311-2222
- ※ 최신의 정보 확인방법 : 이 첨부문서의 작성일자(2014년 6월 18일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.ilhwa.co.kr) 또는 전화 (031)550-0472-8 (주)일화약품 · 개발부를 통해 확인할 수 있음

작성연월일 : 2014년 6월 18일

