

【원료약품의 분량】 1정중 나프로닐옥살산염 (EP) 100mg

【성상】 흰색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 뇌혈행 및 뇌영양장애에 의한 증상
2. 말초, 내이, 눈의 망막 · 맥락막 혈행 및 영양장애

【용법 · 용량】

성인 : 나프로닐옥살산염으로서 1회 100mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 급성 심근경색 환자
 - 2) 출혈성 상해 초기 환자
 - 3) 기립성 조절장애 환자
 - 4) 이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 중증의 신부전 환자
3. 이상반응
 - 1) 정신신경계 : 때때로 불안, 졸음, 불면, 드물게 피로감, 두통, 어지러움 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구역, 위통, 설사 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있다. 4) 간장 : 간염이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
이 약은 고혈압 치료의 목적으로는 사용하지 않는다.
5. 상호작용
혈압강화제와 병용투여시 혈압강화작용이 증강될 수 있다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 모유중으로의 이행이 보고되었으므로 수유중에는 투여하지 않는다.
7. 과량투여시의 처치
과량투여에 의해 심전도억제 및 경련이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 위 세척을 하고, 필요에 따라 활성탄을 사용한다. 심혈관기능과 호흡을 모니터하며, 심한 경우 전기심박조율기를 사용하거나 이소프레날린을 투여한다. 경련의 경우 디아제팜을 투여한다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 설명서작성연월 이후 변경된 내용은 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
- ※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 의약품을 사용하시면 안 되며, 설명서를 꼭 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.

제품문의 : (032) 812-8356

설명서작성연월 : 2015년 01월



제조판매원

영동제약주식회사

인천광역시 남동구 환박로 333
www.yppharm.co.kr