

셀라스틴정 1밀리그램

(아젤라스틴염산염)

전문의약품

분류번호 : 149

- **성분** : 함량 : 1정 중
아젤라스틴염산염(FP).....1mg
겔라제(테룰로스) : 황색5호 알루미늄레이크, 황색203호 알루미늄레이크
겔라제(폴록사민) : 유당수화물, 우유)
- **성상**
밝은 황색의 원형평면코팅정제
- **효능** : 효과
기관지 천식, 알레르기성비염, 두드러기, 습진, 피부염, 아토피성 피부염, 파부성양증, 가려움
- **용법** : 용량
영양아젤라스틴염산염 1정 1mg, 기관지 천식인 경우에는 1회 2mg을 1일 2회 아침식사후 및 취침 전에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
- **사용상의 주의사항**
 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 1) 6세 이하의 유아
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 이 약은 황색5호산셀로로우 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 3. **이상반응**
 - 1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 견대강, 수족마비, 드물게 비틀거림 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구역, 구토, 입안의 기침, 드물게 식욕부진, 복통, 변비, 설사, 위부불쾌감 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 순환기계 : 드물게 얼굴이 달아오름, 손가락 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 호흡기계 : 비건조가 나타날 수 있다.
 - 5) 간장 : 때때로 트랜스아미나제의 활성을 상승시키는 수가 있다. 드물게 AST, ALT, ALP의 상승이 나타날 수 있다.
 - 6) 과민증 : 때로는 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 7) 비뇨기계 : 배뇨곤란, 혈뇨, 드물게 빈뇨가 나타날 수 있다.
 - 8) 혈액계 : 드물게 백혈구 증가가 나타날 수 있다.
 - 9) 기타 : 부종, 월경이상 등이 나타날 수 있다.
- 4. **일반적 주의**
 - 1) 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 2) 장기 스테로이드 요법을 받고 있는 환자에서 이 약 투여에 의해 스테로이드를 감량하고자 하는 경우에는 충분한 관리 하에 천천히 한다.
 - 3) 겔라제 천식에 사용하는 경우, 이 약은 이미 일어나고 있는 발작을 빠르게 경감시키는 약물이 아님을 환자에게 충분히 설명할 필요가 있다.
 - 4) 이 약을 계절성 환자에 투여하고자할 때에는 호발계절을 고려하여 그전에 투여를 시작하고 호발 계절의 종료 시까지 계속하여 투여하는 것이 바람직하다.
- 5. **상호작용**
알코올의 섭취에 의해 진정 작용이 증강될 수 있으며 시메티딘과 병용투여 시에도 주의한다.
- 6. **임부 및 수유부에 대한 투여**
 - 1) 동물 실험에서 대량투여임상 용량의 370배 이상에 의해 기형발생이 보고되고 있으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에게는 치료 상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 동물실험결과에서 유즙 중에 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유중인 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
- 7. **소아에 대한 투여**
미숙아, 신생아, 영아 및 유아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으나 경험에 적다.
- 8. **고령자에 대한 투여**
일반적으로 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.
- 9. **작용상의 주의**
약을 자체의 맛인 쓴맛이 나타날 수 있다.
- 10. **보관 및 취급상의 주의사항**
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
 - 3) 오용을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

- **포장단위** : 자사포장단위
- **저장방법** : 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **소비자 상담실** : 043-845-8841
- **제조회사** : 셀티스팜(주)
충북 충주시 대소원면 천대산로1로 120
- **제 조 자** : (주)일화
강원도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

※ 약은 어린이 손이 닿지 않도록 보관하여야 합니다
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다.
만약 구입 시 유효기한 또한 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. (전화 043-845-8841)
※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)을 통하여 확인하시기 바랍니다.

작성연월일 : 2015년 02월 16일