

일반의약품

기타의 순환계용약

에스다운정 (방풍통성산건조엑스(4.6→1))

S-down Tablet

- ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
※ 사용기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록 합니다.
※ 의약품을 사용하는 동안에는 첨부문서를 함께 보관하시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 방풍통성산건조엑스(4.6→1)(별규)	475 mg
갈경(KP)	166.66 mg
백출(KP)	166.66 mg
감초(KP)	166.66 mg
황금(KP)	166.66 mg
당귀(KP)	100 mg
작약(KP)	100 mg
천궁(KP)	100 mg
치자(KP)	100 mg
연교(KP)	100 mg
박하(KP)	100 mg
형개(KP)	100 mg
방풍(KP)	100 mg
마황(KP)	100 mg
생강(생규)	33.34 mg
활석(생규)	250 mg
망초(생규)	62.5 mg
석고(생규)	166.66 mg
대황(KP)	125 mg

기타첨가제 : 규산칼슘, 스테아르산마그네슘, 오파글로스2투명(97W19196), 오파드라이주황색(86F43071), 오파드라이흰색(03E28796), 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

【성 상】

주황색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

배에 피하(피부밑)지방이 많고 변비기가 있는 환자의 다음 증상 :
고혈압의 동반증상(두근거림, 어깨결림, 흉조), 비만, 부기, 변비

【용법·용량】

보통 성인 1회 2정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이에)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의 총혈작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있다.)
 - 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 영아에게 설사를 유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나 수유를 중단한다.)
- 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
다른 설사약
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장병 또는 신장병(신장장애) 환자
 - 부종(부기) 환자
 - 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 설사, 묽은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 복통, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 - 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 - 땀이 많이 나는 환자(땀과다, 전신탈력감 등이 나타날 수 있다.)
 - 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
 - 배뇨(소변을 누)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)
 - 갑상선기능항진증 환자(질한 및 증상이 악화될 수 있다.)

- 지금까지 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 당뇨병 환자(마황(에페드린 류)에 의해 글리코겐의 분해가 촉진되어 혈당이 상승할 우려가 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 - 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 쌓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
 - 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
 - 피부 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등이 나타나는 경우.
 - 사율신경계 : 불안, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등
 - 비뇨기계 : 배뇨(소변을 누)장애
 - 간기능 장애 : ST, ALT, ALP, γ-GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨))가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 - 1개월 정도(변비에 복용하는 경우 1주일 정도) 복용하여도 증상이 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의할 것.
 - 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용(사용)) 투여할 경우 함유 생약의 중독에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 특히 주의할 것.
 - 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 갑상선제제(티록신,

- 리오택시온), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계 제제(테오필린, 디프로필린)과 병용(함께 복용(사용)) 시 불면, 담과다, 빠른맥, 소변을 자주 봄, 두근거림, 전신무력감, 정신흥분 등의 증상이 나타날 수 있으므로 감량하는 등 신중히 복용할 것.
 - 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이아지드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것.
 - 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
6. 저장상의 주의사항
- 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 (사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.)
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】

기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】

300정/병

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 개봉 후에는 고온 다습한 곳과 직사광선을 피하고 인습에 주의하여 보관하십시오. 만약 유통과정에서 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 및 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 즉시 교환하여 드립니다. 첨부문서 개정일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제 신청 (☎1644-6223) 및 피해구제 상담(☎14-3330)을 할 수 있습니다.

제조외의뢰자 : (주)휴온스메디텍 최종 개정연월일 : 2024. 08. 16
부산광역시 강서구 녹산신단165로 22 EJ3510-07

제조사 : (주)휴온스
충청북도 제천시 바이오텔러 100

판매자 : (주)로하스메디
충남 아산시 회창로 46번길 45-19, 2층
소비자 상담실(반문 및 교환처) : 041-544-2911

Huons Meditech

FILE NAME	에스다운정 설명서
SIZE(mm)	135 X 140
DATE	2024/08/16
VERSION NO.	EJ3510-07

COLORS

PANTONE
Cool Gray 11C

NOTE

원약분량(기타첨가제) 변경, 성상 변경, 사용상의 주의사항 추가, 제조자/제조외의뢰자 순서 변경, 최종 개정연월일 업데이트, 자재코드 업데이트