

효과빠른 순수생약 항염증제 씨엠지은교산캡슐

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

· 유효성분 : 은교산건조엑스로서 500mg

금은화(KP)	710mg
연교(KP)	710mg
두시(생규)	356mg
우방자(KP)	356mg
박하(KP)	426mg
길경(KP)	426mg
감초(KP)	426mg
담죽엽(생규)	284mg
형개(KP)	284mg
영양각(생규)	22mg

· 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색1호, 황색203호

· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

· 기타 첨가제 : 콜로이드성이산화규소, 스테아르산마그네슘, 캡슐

[성상] 갈색의 보말이 충전된 상부 주홍색 불투명, 하부 미황색 불투명의 경질캡슐제

[효능·효과] 감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

[용법·용량] 보통 성인 1회 2캡슐, 7~14세 1캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 5세 미만의 영(젖먹이) · 유아
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp Lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 고혈압 환자
 - 2) 신장에 또는 신장에(신장장애) 환자
 - 3) 부종(부기) 환자
 - 4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)
 - 5) 위장이 허약한 환자
 - 6) 지금까지 약에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 - 7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감령(줄임)하는 등 주의하십시오.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀

이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오. (3) 피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등 (4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용(사용))시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.
- 5) 다른 한약(생약)제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의하십시오.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10캡슐 / PTP포장

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의감게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mids.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

※ 문안작성일 : 2021. 12. 09 (Rev.2)

[제조/회자] (주)씨엠지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조자] 경방산약(주) / 인천광역시 남동구 남동대로 394

[판매자] 일양약품주식회사 / 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110