

# 그린코푸<sup>에스</sup>

가침·가래

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의 깊게 읽어보시고,  
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

## 【원료약품의 분량】1캡슐 중

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 유효성분 : dl-메틸에페드린염산염 (KP) ..... | 12.5 mg |
| 감초엑스 (5.9→1) (별규) .....        | 33.3 mg |
| 구아아폴설펜산칼륨 (USP) .....          | 30 mg   |
| 길경엑스 (3.7→1) (별규) .....        | 20 mg   |
| 카페인부수물 (KP) .....              | 23.3 mg |
| 클로르페니라민말레산염 (KP) .....         | 2 mg    |

첨가제 (타르색소) : 상부 녹색/하부 연녹색 캡슐 중

녹색 3호, 황색 203 호, 황색 5호, 청색 1 호

첨가제 (동물유래성분) : 스테아르산마그네슘 (소, 우지),

유당수화물 (소, 우유)

캡슐 중 젤라틴(소, 우내피)

기타 첨가제 : 경질무수구산, 상부 녹색/하부 연녹색 캡슐

【성상】 감색의 분말이 충전된 상부 녹색, 하부 연녹색의 경질 캡슐제

【효능·효과】 기침, 가래, 천식

【용법·용량】 1일 3회 식후 30분에 복용하십시오.

- 만 15세 이상 : 1회 2캡슐

- 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 1~2캡슐

- 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1캡슐

## 【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 만 3개월 미만의 영아[젖먹이, 갓난아기]

2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람

3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제) 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

4) 이 약은 유당[젖당]을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

다른 진해[기침을 그치게 함]거담제[가래약], 간기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약 [비염[코염]용 경구제, 밀미약, 알레르기용약], 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.

1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염[코염], 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상에 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등을 일으킨 적이 있는 사람

3) 간장질환, 신장[콩팥]질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종[부기], 늑내장예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨소변을 눌곤란 등이 있는 사람, 고령자[노인], 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

6) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

7) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적[충혈되어 붉어짐], 가려움, 구역·구토, 식욕 부진, 어지러움, 배뇨소변을 눌곤란, 목마름[지속적이거나 심한], 불안, 떨림, 불면

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우

① 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 부어腫이고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다.(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류[고임, 췌임], 부종[부기], 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)

② 근병증[근육병증] : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증[근육 병증]이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜하십시오.

2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.

3) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.

4) 만 7세 이하의 영·유아에게는 시럽제를 복용시키십시오.

5) 복용 시에는 음주하지 마십시오.

6) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.

7) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드제 이뇨제(트리클로르메타이리드)와 병용 시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증[근육병증]이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용하십시오.

## 6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에[밀폐하여] 보관하십시오.

3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 10 캡슐

※ 부작용 보고 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

※ 이 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 따라 소비자의 정당한 피해는 보상받을 수 있습니다. 구입 시 사용하기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서의 작성일자 (2019년 3월 6일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.greencross.com)나 소비자상담실 (080-260-0033)로 문의하시기 바랍니다.

제조판매자

 **GC 녹십자**

(주)녹십자

충북 음성군 공평읍 무곡로55번길 26 TEL.031)260-3300  
소비자 상담실 TEL. 080-260-0033

설명-10-1520-8