

2B379N1506



일반의약품

분류번호:119

식욕부진·성장부진

트레스오릭스

캡슐
포르테

【성분·함량】 (1캡슐 중)

시프로헵타딘오로트산염수화물(KP)	1.5mg
L-리신염산염(KP)	150mg
DL-카르니틴염산염(KP)	150mg
시아노코발라민(KP)	1mg
첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색5호	

【성 상】 흰색 내지 연한 분홍색 분말이 들어있는 주황색의 경질캡슐제

【효능·효과】 식욕부진, 성장부진

【용법·용량】

- 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐을 아침·저녁 식전에 8일간 복용, 이후부터는 1일 2회, 1회 2캡슐을 아침·저녁 식전에 복용
- 소아(7~12세) : 1일 1회, 1캡슐을 저녁 식전에 8일간 복용, 이후부터는 1일 2회, 1회 1캡슐을 아침·저녁 식전에 복용
- 소아(3~6세) : 1일 1회 1/2캡슐을 저녁 식전에 8일간 복용, 이후부터는 1일 2회, 1회 1/2캡슐을 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 녹내장 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
- 3) 요저류(소변이 고임)의 소인이 있는 환자
- 4) 고령자(노인) 및 쇠약자
- 5) 신생아

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여하십시오.

3. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 항콜린작용이 있으므로 녹내장질환자나 요폐(소변축적)를 일으킬 수 있는 환자
- 2) 과염소성 혈증성 산증(hyperchloremic acidosis)
- 3) 신부전 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 어지러움, 구역, 발진, 권태감, 정신적 혼란, 식욕부진 등이 나타날 수 있습니다.

- 2) 대량 투여 시는 운동실조, 다혈구혈증, 혈장칼륨 농도저하, 두드러기, 여드름 등이 나타날 수 있습니다.
- 3) 과민성 환자에서는 졸음이 올 수 있습니다.
- 4) 드물게 두통, 구갈(목마름)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 대사성 산증이 나타날 수 있습니다.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

운전 · 기계조작 시 주의합니다.

6. 상호작용

MAO 저해제(억제제) 및 알콜 등 및 기타 중추신경억제제의 효과를 증가시킬 수 있으므로 병용(함께 사용)투여하지 않습니다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 자사포장단위(외부용기표기)

※ 기타 주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기한이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하시기 바랍니다.

※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다.

소비자 상담전화 : 02-2211-6700, www.sinilpharm.com

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 “소비자 분쟁해결기준”에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

※ 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭
[<http://ezdrug.mfds.go.kr>] → [정보마당] → [의약품 등 정보]를 참조하시기 바랍니다.

※ 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원 (1644-6223)

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com



본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 작성년월일 : 2015.06.04