

효과 빠른 **썩펜** 정

속효성 진통제

[일반의약품 | 분류번호 : 114]

두통 / 치통 / 생리통 / 근육통

복용하시기 전에 설명서를 주의깊게 읽어보시고, 반드시 제품과 함께 보관하십시오.

[제품명] 썩펜정

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

아세트아미노펜(KP) 450 mg

DL-메티오닌(KP) 45 mg

[성상] 흰색의 장방형 정제

[효능효과] 두통, 치통, 관절통, 신경통, 근육통, 염좌통(뻘 통증), 월경통(생리통)

[용법용량] 성인 1회 1~2정, 1일 3~4회까지 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응(예, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등)) 및 그 병력이 있는 사람
- 2) 이 약 또는 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제(비스테로이드소염(항염)진통제(NSAID)), 감기약 복용시 천식발작 유발 또는 그 병력이 있는 사람
- 3) 소화성궤양 환자
- 4) 심한 혈액 이상 환자
- 5) 심한 간장애 환자
- 6) 심한 신장(콩팥)장애 환자
- 7) 심한 심장기능저하 환자
- 8) 다음의 약물을 복용한 환자 : 바르비탈계 약물, 심한계 항우울제
- 9) 알코올을 복용한 사람

3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

- 1) 이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.
- 2) 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등과 함께 복용하지 말 것.

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기(중증)에 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유 · 유아 및 어린이(14세 이하)
- 4) 갑상샘질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 5) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 6) 신장(콩팥)장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 7) 소화성궤양의 병력이 있는 환자
- 8) 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자
- 9) 출혈경향이 있는 환자(혈소판 기능 이상이 나타날 수 있다.)
- 10) 심장기능 이상이 있는 환자
- 11) 과민반응의 병력이 있는 환자
- 12) 기관지 천식 환자
- 13) 고령자(노인)
- 14) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 15) 약과파린을 장기복용하는 환자
- 16) 다음의 약물을 복용한 환자 : 리튬, 티아지드계 이뇨제, 레보도파
- 17) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 쇼크 : 쇼크, 아나필락시모양증상(과민성유사증상 : 호흡곤란, 오물이 붉어짐, 혈관부기, 두드러기 등), 천식발작, 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
- 2) 혈액계 : 혈소판 감소, 과립구감소, 용혈성(적혈구 파괴성)빈혈, 메트헤모글로빈혈증, 혈소판기능 저하(출혈시간 연장), 청색증
- 3) 과민반응 : 얼굴부기, 호흡곤란, 땀이 남, 저혈압, 쇼크
- 4) 소화기계 : 구역, 구토, 식욕부진, 장기복용시 위장출혈, 소화성궤양, 천공(뚫림) 등의 위장관계 이상반응
- 5) 피부 : 발진, 알레르기 반응, 피부정맥관 증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사증후군(레일증후군), 고열을 수반

하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우

- 6) 간 : 전신의 나쁜한 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨), 장기투여시 만성간괴사, 만성간염
- 7) 간질성폐렴 : 기침을 동반, 숨이참, 호흡곤란, 발열
- 8) 기타 : 장기투여시 급성폐렴(이차)염, 신장(콩팥)독성
- 9) 과량투여 : 간장, 신장(콩팥), 심근의 괴사
- 10) 아세트아미노펜 단일제에 대해 사람 조 후 조사에서 보고된 추가적 이상반응은 아래 표와 같다. 발현빈도는 매우 흔하게 $\geq 1/10$, 흔하게 $\geq 1/100$ 이고 $< 1/10$, 흔하지 않게 $\geq 1/1,000$ 이고 $< 1/100$, 드물게 $\geq 1/10,000$ 이고 $< 1/1,000$, 매우 드물게 $< 1/10,000$ 이다.

표. 자발적 보고율로부터 추정된 빈도에 따른 아세트아미노펜 단일제의 사람후 경험에서 밝혀진 이상반응

면역계	피부 및 파하(파부발)조직
매우 드물게 : 아나필락시스 반응, 과민반응	매우 드물게 : 두드러기, 가려움발진, 발진

11) 아세트아미노펜 단일제 국내 이상반응 보고자료의 분석 · 평가에 따라 다음의 이상반응을 추가한다.

(1) 간담도계 : AST 상승, ALT 상승 (2) 피부 : 고정(固定)발진

12) 수핵(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약을 복용시 주의할 사항

1) 일반적주의

- (1) 소염(항염)진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법(증상별로 치료하는 방법)이다.
- (2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - ① 장기복용하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 받고 이상이 있을 경우 감량(줄임), 복용중지 등의 적절한 조치를 해야 한다.
 - ② 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- (3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - ① 급성통증 및 발열의 정도를 고려하여 복용한다.
 - ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기복용을 피한다.
 - ③ 원인요법이 있는 경우에는 실시한다.
- (4) 소아 및 고령자(노인)는 최소 필요량을 복용하고 이상반응에 유의한다. 과도한 체온강하, 허탈, 사지냉각 등이 나타날 수 있으므로, 특히 고열을 수반하는 소아 및 고령자(노인) 또는 소모성 질환 환자의 경우 복용 후의 상태를 충분히 살펴야 한다.
- (5) 다른 소염(항염)진통제와 함께 복용하는 것은 피한다.
- (6) 의사 또는 약사의 지시 없이 통증에 10일 이상(성인) 또는 5일 이상(소아) 복용하지 않고 발열에 3일 이상 복용하지 않는다. 통증이나 발열 증상이 지속되거나 악화될 경우, 또는 새로운 증상이 나타날 경우 의사 또는 약사와 상의한다.
- (7) 이 약 복용시 감염증을 겹으로 나타내지 않게 할 수 있으므로 감염증이 합병된 환자의 경우에 의사 처방에 따라 적절한 항균제를 함께 복용해야 한다.

2) 상호작용

- (1) 바르비탈계 약물, 심한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- (2) 메티오닌과 레보도파의 병용(함께 복용)투여시 레보도파의 효과를 억제할 수 있다.
- (3) 과량투여시의 처치
이 약을 과량복용시 어떠한 명백한 증상이나 징후가 없더라도 신속하게 의학적 처치를 받아야 한다. 10~12시간 이내에 N-아세틸시스테인 정맥주사를 투여 받거나 메티오닌을 경구복용하여 간을 보호해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 적시광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품은 원래의 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 자사포장단위(외부포장에 표기)

[제조자] ㈜씨트리 경기도 남양주시 경강로 27

[제조/회자] 경남제약(주) 충남 아산시 신항면 서부남로790번길 49

※ 기타주의

1. 허가된 효능 · 효과와 다른 용도로 사용시에는 예상하지 못한 부작용이 나타날 수 있습니다.
2. 사용기간이 지난 제품은 변질의 우려가 있으므로 복용을 금하십시오.
- ※ 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 · 약사 및 자사 소비자 상담실로 문의하시기 바랍니다. 소비자 상담전화 : 080-232-8600, www.kyungnampharm.co.kr
- ※ 만약 구입한 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오염된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회고시 「소비자분쟁 해결기준」에 의거 구입한 곳에서 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
- ※ 의약품의 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관 「http://drug.mfds.go.kr」 → 「의약품 검색」을 참조하시기 바랍니다.

《 설명서 작성연월일: 2015.07.21 》