

췌장염 및 역류성식도염 치료제

호이콜 정

100밀리그램
200밀리그램

(카모스타트메실산염)

[원료약품 및 그 분량]

호이콜정 100밀리그램 : 1정 중

주성분 : 카모스타트메실산염(JP).....100mg

호이콜정 200밀리그램 : 1정 중

주성분 : 카모스타트메실산염(JP).....200mg

[성 상] 흰색 또는 황백색의 원형 필름 코팅정제

[효능·효과] · 단백분해 효소(트립신, 칼리크레인, 플라스민 등)의 일탈에 의한 만성췌장염의 급성증상의 완화
· 위절제 수술 후 역류성 식도염

[용법·용량] · 만성췌장염

성인 : 카모스타트메실산염로서 1회 200mg을 1일 3회 경구투여 한다.

· 위절제 수술 후 역류성 식도염

성인 : 이 약으로서 1회 100mg을 1일 3회 투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에게 투여하지 말 것

- 1) 위액흡인, 절식, 절음 등의 식사제한을 필요로 하는 중증 환자
- 2) 위액의 역류에 의한 수술 후 역류성 식도염 환자(이 약의 효과를 기대할 수 없다)
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 2) 소아
- 3) 고령자

3. 이상반응

- 1) 혈액계 : 호산구 증가, 드물게 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나면 감량 또는 투여를 중지한다.
- 2) 과민반응 : 때때로 발진, 가려움 등의 과민증상이 나타날 수 있으므로, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구갈, 복통, 복부불쾌감, 복부팽만감, 설사, 드물게 구토, 가슴쓰림, 변비 등이 나타날 수 있다.
- 4) 간장 : 때때로 AST, ALT 수치의 상승, 간기능 이상이 나타날 수 있다.
- 5) 신장 : 드물게 BUN, 크레아티닌 상승이 나타날 수 있다.
- 6) 기타 : 때때로 부종, 드물게 저혈당, 고칼륨혈증이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

이 약으로 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 장기간 투여하지 않는다.

5. 임부에 대한 투여

인체 투여량의 40배(400mg/Kg/1일) 이상을 투여한 동물실험에서 태자 체중의 억제가 보고되었으므로 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 대량투여를 피한다.

6. 소아에 대한 투여

저체중 출생아, 신생아, 유아, 또는 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다).

7. 고령자에 대한 투여

고령자에 이 약을 투여하면 성인에 비해 이상반응이 더 심하게 나타날 수 있다.

8. 보관 및 취급상의 주의사항

배합주의: 올메살탄메독소밀 제제와 병용 처방되어 동일 약포지에 담겨 조제할 때, 이 약의 변색이 일어날 수 있으므로, 다른 약포지에 담겨 조제하도록 한다.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 자사 포장단위

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사/약사와 상담하십시오.

※ 본 의약품은“우수 의약품제조관리기준(KGMP)”에 따라 엄격하게 제조 및 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다.

※ 문서작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 홈페이지(www.pharmbio.co.kr)의 제품정보 또는 이지드럭(ezdrug.mfds.go.kr) 의약품 정보를 통해 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자상담실 : 02-587-2551 (학술부)

설명서작성년월일 : 2015년 1월 20일

HCT -11

제조판매자

 **(주)한국팜비오**

충북 충주시 충주산단7로 53