

라니넥스나잘스프레이

(모메타손푸로에이트)

전문의약품

분류번호 132

K.G.M.P

우수의약품저장업체

【원료약품 및 그분량】 1mL 중

모메타손푸로에이트(EP) ----- 0.5mg

첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(KP) ----- 0.2mg

【성상】 흰색 또는 거의 흰색에 가까운 불투명한 현탁액이 일정량씩 분무되는 용기에 든 비강분무액

【효능·효과】

- 성인 및 2세 이상의 소아 : 계절 알레르기비염 및 연중비염, 중등도~중증의 계절 알레르기 비염의 증상이 있었던 환자에서 예방요법은 화분기 시작 예정일(알러젠 노출예정일)의 2~4주 전에 시작할 수 있다.
- 18세 이상의 성인 : 비염증
- 성인 및 12세 이상의 청소년 : 중증의 세균 감염이 없는 급성 비부비동염

【용법·용량】

1. 알레르기비염

- 분무기를 1회 누를 때마다 모메타손푸로에이트 현탁액 약 100 mg이 방출되며, 이것은 모메타손푸로에이트 0.05 mg(무수물로서)을 함유한다. 균일한 분무를 위해 10분 시험분무한 후 사용하고 만일 분무기를 14일 이상 사용하지 않았을 때에는 다음 사용 전에 다시 2회 시험분무 해야 한다.
- 1) 성인(고령자 포함) 및 12세 이상의 청소년 :
- 일반적으로 1회 각 비공에 2번씩 1일 1회 분무 한다(1일 총용량 0.2 mg). 증상이 경감되면 유지용량으로 분무회수를 각 비공당 1번씩으로 줄일 수 있다(1일 총용량 0.1 mg).
- 증상이 경감되지 않으면 1회 각 비공에 최대 4번까지 1일 1회(1일 총용량 0.4 mg) 용량을 증강시킬 수 있으며 증상이 경감되면 용량을 감소시키는 것이 권장된다. 최대의 치료유익을 얻기 위해서는 규칙적으로 사용해야 한다.
- 2) 2~11세의 어린이 :
- 일반적으로 1회 각 비공마다 1번씩 1일 1회 분무한다(1일 총용량 0.1 mg).
2. 비염증
- 일반적으로 1회 각 비공마다 2번씩 1일 1회 분무 한다(1일 총용량 0.2 mg).
- 5~6주 후에도 증상이 경감되지 않으면 1회 각 비공마다 2번씩 1일 2회 분무(1일 총용량 0.4 mg)까지 용량을 증강시킬 수 있으며 증상이 경감되면 용량을 감소시키는 것이 권장된다.
- 5~6주간 1일 2회 투여 시에도 증상 경감이 나타나지 않으면 다른 치료법을 고려한다.
- 비염증 치료를 위해 이 약을 4개월 이상 사용한 연구는 없다.
3. 급성 비부비동염
- 일반적으로 1회 각 비공마다 2번씩 1일 2회 분무 한다(1일 총 용량 0.4 mg).

■ 라니넥스나잘스프레이 사용방법

부작용 위험성을 최소화하면서 최대의 치료효과를 얻기 위해서는 적절한 용량을 사용하는 것이 매우 중요하며, 치료 시작 전에 용법·용량과 사용법을 충분히 숙지하여야 합니다.

처음 사용시 약액이 잘 분사되지지 확인이 필요합니다. 그림 2와 같이 병을 쥐고, 검지와 중지로 펌프를 10회 정도 눌러주어 약액이 균일하게 분사되는지 확인하시기 바라며, 직접 사용일이 일주일 이상 지난 경우에는 동일한 방법으로 재확인하여야 합니다.

약액이 잘 분사되지 않는 경우에는 분사기의 입구를 물로 깨끗이 씻고 건조시킨 후 사용하시면 되며, 매번 사용 전에는 용기를 잘 흔든 후 아래 그림 및 사용법대로 사용하시기 바랍니다.



- 용기를 잘 흔들어 준 후, 제일 위의 녹색 뚜껑을 엽니다.



- 분사한 후에는 코로 숨을 가볍게 들이마신 다음, 입으로 숨을 내뿜습니다.



- 약있던 다른 콧구멍 속에도 같은 방법으로 분사한 후, 코로 숨을 가볍게 들이마신 후, 입으로 숨을 내뿜습니다.
- 마지막으로 녹색 뚜껑을 닫습니다.



■ 용기의 청결관리


라니넥스나잘스프레이의 펌프가 잘 작동하려면 용기를 주기적으로 깨끗이 씻어 청결히 관리하는 것이 중요합니다. 어떠한 경우에도 분사구의 구멍을 찌러서는 안 됩니다.



- 녹색 뚜껑을 열고 흰색 분사기를 살짝 위로 밀어서 펌프에서 분사기를 분리하십시오(그림 4).

- 차가운 수도물로 녹색 뚜껑과 분사기를 씻는데, 특히 분사구 부위를 깨끗이 씻은 후 물기를 제거하고 건조시킵니다.

- 원래대로 펌프를 분사기에 끼우고 난 후 녹색 뚜껑을 닫아 보관하십시오.



【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 않 것.
 - 이 약 또는 이 약의 구성성분에 대해 과민반응 등 병력이 있는 환자
 - 비강점막에 치료되지 않은 국소감염이 있는 환자
 - 최근에 비강의 외과수술을 받았거나 비강의 질병을 가진 환자, 비종격막염 환자 또는 코에 외상이 있는 환자(코르티코스테로이드류의 상처치유 방해효과를 고려하여 이러한 환자는 치유가 될 때까지 비강용 코르티코스테로이드류를 사용해서는 안 된다.)
 - 2세 미만의 영아
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 호흡기도의 활동성 또는 잠복성 결핵이나 치료되지 않은 전신성 진균, 세균, 바이러스성 감염, 또는 눈에 단순포진이 있는 환자
 - 빈맥성 코피(출혈을 악화시킬 수 있다.)
 - 수두 또는 홍역의 감염 가능성이 있는 환자(‘일반적 주의’ 참조)
 - 편측성 비염증, 남성 성유종 관련 비염증, 비강을 완전히 폐색한 비염증 환자(이러한 환자들에 대해 이 약의 효과는 연구되지 않았다. 비정형성이거나 불규칙한 모양의 편측성 비염증, 특히 출혈이 있거나 궤양성일 경우는 더 상세히 평가되어야 한다.)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 이상반응
 - 알레르기비염 : 미국과 여러 나라에서 실시된 임상시험에서 총 3,210명의 12세 이상의 성인과 청소년 환자에게 이 약을 1일 50~800㎍ 용량으로 투여하였다. 환자의 대부분(n = 2,103)은 1일 200㎍ 용량으로 투여 받았다. 미국과 여러 나라에서 실시된 임상시험에서 총 990명의 소아 환자(3세 ~11세)에게 이 약을 1일 25~200㎍ 용량으로 투여하였다. 환자의 대부분(n = 720)은 1일 100㎍ 용량으로 투여 받았다. 총 513명의 성인과 소아 환자가 1년 이상 투여 받았다. 대체적인 이상반응 발생률은 위약 투여군과 이 약 투여군에서 유사하였다. 또한, 연령이나 성별 또는 인종에 따른 유의적인 차이도 나타나지 않았다. 3% 이상의 환자가 이상반응으로 인해 투약을 중단하였다. 이것은 위약투여군 및 활성 비교군에서와 유사한 빈도이다.
12세 이상의 성인과 청소년 환자에게 이 약 1일 200㎍ 용량으로 투여한 임상시험과 3~11세의 소아 환자를 대상으로 이 약 1일 100㎍ 용량으로 투여한 임상시험에서 5% 이상 일어나고 위약군보다 빈번하게 보고된 이상반응(약물투여와의 관련성 여부와 상관없이)은 다음 표1과 같다.
<표1>

계절성과 연중 알레르기비염에 대한 임상시험에서 나타난 이상반응 (보고된 환자수에 대한 백분율(%))				
	12세 이상의 성인과 청소년 환자		3~11세의 소아환자	
	이 약 200㎍ (n=2,103)	위약 (n=1,671)	이 약 100㎍ (n=374)	위약 (n=3,761)
두통	26	22	17	18
바이러스 감염	14	11	8	9
인두염	12	10	10	10
코피/혈액받침을 띠는 점액	11	6	8	9
기침	7	6	13	15
상기도 감염	6	2	5	4
혈경곤란	5	3	1	0
근골격계의 통증	5	3	1	1
부비동염	5	3	4	4
구토	1	1	5	4

- 이 약 200㎍ 용량을 투여한 성인과 청소년 환자 (12세 이상의 2% 이상 5% 미만에서 일어나고 위약군에서 일어난 것 보다는 빈번한 다른 이상반응 : 관절통, 천식, 기관지염, 흉통, 결막염, 설사, 소화불량, 이통(earache), 감기(증상(fu-like symptoms), 근육통, 구역, 비염
- 이 약 100 ㎍ 용량을 투여한 소아 환자(3~11세의 2% 이상 5% 미만에서 일어나고 위약군에서 일어난 것 보다는 빈번한 다른 이상반응 : 설사, 코의 염증(nasal itation), 중이염, 천명
- 2~5세의 소아 환자에게 이 약 1일 100㎍ 용량으로 투여한 56명의 환자를 대상으로 하논(이 약 투여군 28명, 위약군 28명) 임상시험에서 위약군보다 빈번하게 보고된 이상반응(약물투여와의 관련성 여부와 상관없이) : 상기도 감염(각각 7% vs 0%)
- 이 약 100㎍ 용량을 투여한 2~5세의 소아 환자의 2% 이상 5% 미만에서 일어나고 위약군에서 일어난 것 보다는 빈번한 다른 이상반응 : 피부의 외상
- 일본에서 실시된 임상시험에서 성인 및 소아 2,053명에게 이 약을 투여하였을 때 발생한 이상반응은 다음 표 2와 같다.
<표 2>

	1% 이상 5% 미만	1% 미만
피부	—	두드러기와 같은 발진
호흡기계	코증상(자극감, 가려움, 건조감, 통증, 발적, 불쾌감 등), 코 진균검사 양성, 인후두증상(자극감, 통증, 불쾌감, 건조감 등)	비출혈, 콧물, 코막힘, 재채기, 후각장애 기침, 상기도감염
간장	—	간기능장애, ALT 상승, AST 상승, 혈중 빌리루빈 증가, 혈중 알칼리인산분해효소 상승
정신신경계	—	권태감, 두통
혈액계	혈중 코르티솔 감소	호중구 수 증가, 호산구 수 증가, 단구 수 증가, 백혈구 수 감소, 백혈구 수 증가, 백혈구 수 이상, 적혈구 수 감소, 헤모글로빈 감소, 적혈구 용적률 감소, 림프구 감소, 혈소판 감소, 혈중 칼륨 증가, 혈중 코르티솔 증가, 당뇨, 혈액 요소 증가
비뇨기계	—	우로빌린뇨증, 단백뇨

2.비염증: 4주 이상 이 약을 투여한 군에서 코의 궤양과 코와 구강 칸디다증이 드물게 보고되었다.		
비염증 임상 환자에서 전반적인 이상반응 발생률은 위약과 유사했으며, 알레르기 비염 환자에서 관찰된 이상반응들과 유사했다. 비염증 임상에서 보고된 이상반응은 다음 표3에 제시되어 있다.		
<표 3>		
비염증 임상시험에서 이 약 관련 이상반응으로서 1% 이상의 피험자에서 보고된 것		
매우 자주(>1/10) : 자주(>1/100, <1/10) : 때때로(>1/1,000, <1/100) : 드물게(>1/10,000, <1/1,000) : 매우 드물게(<1/10,000)		
	200㎍ 1일 1회 투약	200㎍ 1일 2회 투약
호흡기, 흉부 및 종격동의 질환		
상기도 감염	자주	때때로
코피	자주	매우 자주
소화기계 질환		
목의 자극감	—	자주
일반적 질환 및 투여부위 증상		
두통	자주	자주

- 급성 비부비동염 : 급성 비부비동염 환자를 대상으로 한 임상시험에서 전반적인 이상반응 발생률은 위약과 유사했으며 다른 하기된 적응증의 경우들과 비슷했다. 급성 비부비동염 임상에서 보고된 이상반응은 다음 표4에 제시되어 있다.
<표4>

비부비동염 임상시험에서 이 약 관련 이상반응으로서 2% 이상의 피험자에서 보고된 것		
매우 자주(>1/10) : 자주(>1/100, <1/10) : 때때로(>1/1,000, <1/100) : 드물게(>1/10,000, <1/1,000) : 매우 드물게(<1/10,000)		
	200㎍ 1일 1회 투약	200㎍ 1일 2회 투약
호흡기, 흉부 및 종격동의 질환		
상기도 감염	—	—
코피	자주	자주
소화기계 질환		
복통	자주	자주
설사	자주	자주
구토	자주	자주
일반적 질환 및 투여부위 증상		
두통	자주	자주

비부비동염 임상시험에서 이 약 관련 이상반응으로서 2% 이상의 피험자에서 보고된 것		
매우 자주(>1/10) : 자주(>1/100, <1/10) : 때때로(>1/1,000, <1/100) : 드물게(>1/10,000, <1/1,000) : 매우 드물게(<1/10,000)		
	200㎍ 1일 1회 투약	200㎍ 1일 2회 투약
호흡기, 흉부 및 종격동의 질환		
상기도 감염	—	—
코피	자주	자주
소화기계 질환		
복통	자주	자주
설사	자주	자주
구토	자주	자주
일반적 질환 및 투여부위 증상		
두통	자주	자주

- 가장 자주 발생한 이상반응인 코피는 이 약으로 치료받은 환자군(29~37%)과 위약 투여 환자군(2.6%)에서 거의 같은 빈도로 발생하였다.
- 이 약의 비강 내 투여 후 드물게 기관지 경련 및 호흡곤란 등의 즉시형 과민반응이 나타날 수 있다. 매우 드물게 아나필락시스 증상(호흡곤란, 전신홍조, 혈관부종, 두드러기 등)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중단하고 적절한 처치한다.
- 특히 장기간 고용량의 비강용 코르티코스테로이드 투여 시 전신작용이 나타날 수 있다.
- 중증의 세균 감염(발열, 중증의 지속적인 편측 안면 통증 및 치통, 눈 또는 눈 주위의 안면부종, 혹은 최초 개선 이후 증상의 악화)의 증상이나 징후가 관찰되면 즉시 의사와 상의하여야 한다.
- 시판 후 조사에서, 코의 작업감각 염증, 과민반응과 혈관부종이 보고되었고 비종격 천공이 드물게 보고되었다. 미각과 후각의 이상도 매우 드물게 보고되었다.
- 일반적 주의
 - 이 약으로 치료 후 12개월 동안 비점막의 어떠한 위축증상도 뚜렷하지 않았다. 또한 이 약은 비점막을 정상적인 조직 표현형에 가깝게 회복시키는 경향을 나타내었다. 모든 장기치료에서와 마찬가지로 이 약을 수개월 또는 그 이상 사용하는 환자들은 비점막의 무혈관성 변화를 확인하기 위하여 정기적으로 검사를 받아야한다. 만약 비강이나 인두에 국소적인 진균감염이 나타나면, 이 약의 투여를 중단하거나 적절한 치료가 요구될 수 있다. 비인두 자극이 계속되면 이 약의 치료를 중단해야 할 수도 있다.
 - 대부분의 환자에서서 비증상을 경감시키므로 적절한 부가 치료약의 동시사용은 추가적으로 다른 증상들, 특히 안증상의 경감을 가져올 수 있다.
 - 이 약의 장기투여에 따른 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)축 억제계의 증가는 없다. 그러나 전신성 활성 코르티코스테로이드류를 장기간 투여하다가 이 약으로 변경한 환자들에게는 특별한 주의가 필요하다. 그러한 환자들에서서 전신성 코르티코스테로이드류를 중단하면 HPA축 기능이 회복될 때까지 수개월동안 부신기능부전을 나타낼 수 있다. 만일 이 환자에서 부신기능부전의 증상 및 증후를 나타내면 전신성 코르티코스테로이드의 투여를 재가하여야 하며, 다른 형태의 치료와 적절한 측정방법을 설정해야 한다.
 - 전신성 코르티코스테로이드류에서 이 약으로 바꾸는 동안 일부 환자는 비증상이 경감됨에도 불구하고 전신 활성 코르티코스테로이드류의 급단 증상에, 관절 및 근육통, 피로감, 초기의 우울감을 경험할 수 있으나 이 약을 계속 사용하도록 권장한다. 이러한 타락제로의 변경은 전신성 코르티코스테로이드 치료에 의해 이전에 억제되어 있던 알레르기결막염과 습진과 같은 이미 존재하고 있는 알레르기 질환을 드러낼 수 있다.
 - 코르티코스테로이드류와 강력한 면역억제제를 투여 받고 있는 환자들에게는 특정 감염들(예, 수두, 홍역)에 노출될 위험성과, 그러한 감염들에 노출된 경우 의학적 조언을 구할 중요성에 대해 경고해 주어야 한다. 특히, 이 약 투여 중에 수두 또는 홍역에 감염되면, 치명적인 결과에 이를 수 있으므로, 다음 주의가 필요하다.
 - 이 약 투여 전에 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종의 유무를 확인한다.
 - 수두 또는 홍역의 병력이 없는 환자에 대해서는 수두 또는 홍역에의 감염을 최대한 방지하여 충분한 배려와 관찰을 한다. 감염이 의심스러운 경 우와 감염된 경우에는 즉시 진찰을 받아 지도하고, 적절한 처치를 한다.
 - 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종을 받은 적이 있는 환자에서도 이 약 투여 중에 수두 또는 홍역이 나타날 가능성이 있으므로 유의한다.
 - 처음 48시간 이내에는 충분한 기대효과가 나타나지 않을 수 있다.
 - 비강 코르티코스테로이드를 소아환자에게 투여하는 경우 성장이 지연될 수 있다(‘소아에 대한 투여’ 참조). 이 약의 임상시험에서 코나 인두에 칸디다(Candida albicans) 감염이 매우 드물게 나타났다. 이러한 감염이 나타난 경우, 이 약의 사용을 중지하고 적절한 국소 또는 전신요법으로 대체해야 한다.
 - 이 약을 1일 200㎍ 투여하여 12주간의 대조시험과 12개월간의 비대조시험을 통해 인압 측정법과 세극경 검사법으로 녹내장과 백내장의 유발 여부를 평가하였다. 12주 동안 141명의 환자에게 이 약을 투여하고, 141명의 위약 투여 환자도 비조대사에 영향을 미치지 않았다. 이 약의 혈중농도는 검출되지 않았으며 (정량한계 50 pg/mL인 정량법을 사용한) 병용요법은 내성이 좋은 것으로 나타났다.
 - 모메타손푸로에이트는 CYP3A4를 통해 대사가 이루어진다. 강력한 CYP3A4 억제제(예, 리토나비르 등) 투여 시 전신 작용을 유발할 수 있다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임신한 여성에게서의 적절한 연구는 없다. 다른 비강용 코르티코스테로이드류에서와 같이 이 약은 모체에 대한 잠재적인 유익성이 모체, 태아 및 영아에 대한 잠재적인 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 임부 또는 수유부에게 투여한다.
 - 임신 중 코르티코스테로이드류를 투여 받은 어머니에게서 태어난 영아는 세심하게 부신기능부전을 관찰하여야 한다.
 - 소아에 대한 투여
 - 소아 환자에게 비강 코르티코스테로이드의 투여에 대한 임상시험에서 성장속도가 감소될 수 있다는 결과가 나타났다. 시상하부-뇌하수체-부신(HPA) 축 억제에 대한 증가가 관찰되지 않는 상태에서 얻어진 이러한 결과는, 성장속도가 흔히 사용되는 HPA 축 기능의 테스트보다도 전신성 코르티코스테로이드의 노출에 대해 보다 더 민감한 척도임을 시사하는 것으로 보여진다. 성인이 되었을 때의 최종 키에 대한 영향을 포함한 성장속도의 저하에 대한 장기적인 효과는 알려지지 바가 없다. 비강 코르티코스테로이드 치료의 중단 시에 보상성 성장에 대한 가능성은 적절한 연구되지 않았다. 이 약을 포함한 비강 코르티코스테로이드를 투여받은 소아 환자의 성장은 장기적으로 관찰되어야 한다. 장기적인 투여 시에 얻어지는 임상적인 효과 및 다른 선택 가능한 비코르티코스테로이드 약물 치료의 안전성과 유효성에 성장에 대한 영향의 가능성과 비교하여 고려하여야 한다. 이 약을 포함한 비강 코르티코스테로이드의 전신 효과를 최소화 하기 위하여 각각의 환자에 대하여 최소 유효 용량이 처방되어야 한다.
 - 3~11세의 720명의 환자에게 이 약(1일 총 투여량 100㎍)을 투여한 임상시험이 시행되었다. 2~5세의 28명의 환자에게 안전성을 평가하기 위하여 이 약(1일 총 투여량 100㎍)을 투여한 임상시험이 시행되었다. 2세 미만의 소아 환자에 대한 안전성과 유효성은 확립되지 않았다. 소아 환자(3~9세)에게 이 약(1일 총 투여량 100㎍)의 성장속도에 대한 영향을 측정하기 위한 1년간의 임상시험이 수행되었다. 위약과 비교하여 이 약의 투여가 성장 속도에 미치는 영향은 통계학적인 유의성을 보이지 않았다. 30분 동안의 코신티로민 주입 후에 HPA 축 억제에 대한 임상적인 증거는 나타나지 않았다. 이 약의 성장 억제 유발 가능성은 감소되어 있는 환자 또는 높은 농도로 투여 받았을 때에는 배제될 수 없다.
 - 18세 미만의 청소년 및 소아의 비염증에 대한 이 약의 효과는 연구된 바 없다.
 - 12세 미만 소아의 비부비동염에 대한 이 약의 효과는 연구된 바 없다.

- 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하여 신중히 투여한다.
- 과량투여에의 처치

이 약의 전신성 성체 내 이용률은 1% 미만으로(최저검출한계 0.25pg/mL인 고감도의 정량법을 사용한), 과량투여 시에는 적절한 용량의 투여 후 관찰 이외에 특별한 치료를 요구하지 않는다. 그러나 일반적으로 과량의 코르티코스테로이드류를 흡입 또는 경구투여 시 HPA축 기능의 억제가 일어날 수 있다.
- 적용상의 주의
 - 초회용량을 투여하기 전에 용기를 잘 흔든고 펌프를 10회 (균일한 분사가 확인될 때까지) 시험 분사한다. 만일 펌프를 14일 이상 사용하지 않은 경우에는, 미리 2회 시험분사한다. 매 사용 전에 용기를 잘 흔든다. 이 약은 포장에 표시된 횟수만큼 분무한 후 또는 처음 사용한다 2개월 후에는 버려야한다.
 - 이 약을 눈 또는 비종격에 직접적으로 투여 분사하지 않도록 주의하고 비강 내 분무용으로만 사용한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항

어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 기타

운전기능 및 기계 작동 등 시 미치는 영향은 알려진 바 없다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(2~25℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 18g(140dose)

【제조자】 한림제약(주) 경기도 용인시 처인구 영문로 2-27

【제조회회사 및 판매】 (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

- 본의약품은 우수의약품관리기중(KGMP)에 의한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 이약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다. 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참고하시기 바랍니다.
- 내가 신고한 작은 부작용을 국민건강 초석재단(온라인의약품도서관 : 1577-1255, drug.mfds.go.kr)
- 이 첨부문서의 개정년월일 이후로 변경된 허가사항은 당사 홈페이지(www.bi-nex.com)나 전화 (080-263-3151)로 문의하시면 확인하실 수 있습니다.

http://www.bi-nex.com

☎080-263-3151

개정년월일 : 2015년 1월 8일