

스웨클로액의 조립 순서

KGMP 우수의약품 적격업체



스웨클로액의 사용방법

1. 취침 전 적용 부위를 잘 씻어줍니다.
2. 씻은 부위를 드라이기나 선풍기를 이용하여 잘 말려줍니다.
3. 해당 부위에 스웨클로액의 볼을 한번씩 굴려 꼼꼼히 발라줍니다.
4. 다음날 아침, 물로 적용 부위를 깨끗이 씻어냅니다.

【원료약품 및 그 분량】이 약 100mL 중

염화알루미늄(USP) 20.00g

(무수물로서는 11.00g)

【성상】 특이한 냄새가 있는 무색투명한 액

【효능·효과】 겨드랑이, 손, 발의 다한증(땀 과다증)

【용법·용량】 저녁에 적용 부위에 적당량을 바른 후 다음날 아침 물로 씻어 제거한다.

발한(땀이 남)이 멈출 때까지는 매일 밤 한번씩 사용하고 증상이 호전(나아짐)될 경우에는 일주일에 1~2회로 줄인다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약 성분에 과민증인 환자.
2. 다음 부위에는 적용하지 말 것 : 이 약을 벗겨지거나 손상된 피부, 또는 최근에 면도한 부위에는 적용하지 말 것.
3. 일반적 주의
 - 1) 치료 대상 부위에만 사용하여야 하며 적용 부위는 완전히 건조한 상태를 유지시켜야 한다.
 - 2) 눈이나 점막에 닿지 않도록 주의한다.
 - 3) 이 약을 사용 후 땀분비의 감소가 일시적으로 자극감이나 발적(충혈되어 붉어짐)을 초래할 수 있으며 이러한 증상이 심해지면 사용을 일시 중단하여야 한다.
4. 과다 적용시의 처치 : 과다 적용시 자극감, 발적(충혈되어 붉어짐), 낙설이 일어날 수 있으며 이러한 증상이 나타났을 경우 필요에 따라 습윤제나 1% 히드로코르티손 크림을 바른다.
5. 적용상의 처치 : 이 약을 적용하기 바로 직전에 목욕은 피해야 하며 적어도 적용 후 한시간은 지나야 한다. 겨드랑이의 털은 이 약을 적용하기 12시간 전후로는 제거하지 말아야 한다.

【포장단위】 30mL

【저장방법】 차광기밀용기, 25℃이하 서늘한 곳 보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질 관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자의 피해를 보상해드립니다.

※ 본 제품은 영·유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 본 첨부문의 내용은 최신 정보 및 허가 정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) 또는 콜로버서비스(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

【소비자상담실】 080-024-0030(수신자부담 콜로버서비스)

【제조 의뢰자】 광동제약(주) 경기도 평택시 산단로 114

【제조자】(주)퍼슨 충남 천안시 서북구 백석공단1로 47

작성일자: 2015.11.17

LL151117-002FS