

효과빠른 Neosol® 공법

기침감기약 블루콜M 연질캡슐

기침 • 가래

【제품명】 블루콜엠 연질캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(770mg) 중

구아이페네신(KP) ----- 90.00mg

덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물(KP) ----- 20.00mg

트리메토크놀염산염수화물(KP) ----- 1.00mg

착색제(천연색소) : 치자청색소

【성상】 미황색(연노랑) 내지 연한 청색의 내용물을 함유한 암갈색의 타원형 연질캡슐

【효능 • 효과】 기침, 가래

【용법 • 용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐 식후 30분에 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것.

다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 알미약, 알레르기용약), 진정제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 고령자(노인), 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열 · 발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 어지러움, 불안, 떨림, 불면
- 2) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 만 7세 이하의 영아(갓난아기), 유아에게는 시럽제를 복용시킬 것.
- 3) 복용시에는 음주하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 / 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

【포장단위】 10연질캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

-
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통해 교환하여드립니다.
 - ※ 본 제품은 공정거래위원회고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해드립니다.
 - ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
 - ※ 설명서 작성일자(2015년 01월)이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
 - ※ 소비자 상담실(반품 및 교환처) : 080-784-7800
-

작성일 : 2015년 01월

제조원 : **RP Corp** (주) 알피 Corp
경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7