

# 비알에스락<sup>캡슐</sup>

(바실루스리케니포르미스균)

**[원료약품의 분량]** 이 약 1캡슐(440mg) 중

바실루스리케니포르미스균(별규)..... 250mg

 (바실루스리케니포르미스균으로서  $2.5 \times 10^8$ 마리)

첨가제(동물유래):유당수화물(소-우유)(KP) ..... 54mg

**[성상]** 백색의 분말이 든 상부 하부 백색의 캡슐제

**[효능·효과]** 급·만성장염, 급·만성설사, 급성이질, 각종원인에 기인한 장내 이상발효

**[용법·용량]**

- 성인 : 1회 2캡슐 1일 3회 복용
- 유소아 : 1회 1캡슐 1일 3회 복용
- 유아의 경우 캡슐내용물을 소량의 물이나 우유에 타서 복용할 수 있다.

**[사용상의 주의사항]**

본 제는 항생물질과 병용투여하여도 되나 시프로플록사신, 이미페넴, 실라스타틴나트륨과의 병용투여는 피하는 것이 좋다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

의사의 치료를 받고 있는 환자

3. 일반적 주의

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.

2) 1개월정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.

4. 소아에 대한 투여

3개월 미만의 영아에게 투여할 경우 의사 또는 약사와 상의 한다.

5. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

**[저장방법]** 기밀용기, 실온( $1 \sim 30^{\circ}\text{C}$ )보관

**[포장단위]** 30캡슐, 300캡슐

※유효기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품 등은 구입하신 곳에서 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

 ※이 설명서의 개정일 이후 변경된 내용은 본사 홈페이지([www.boryungbio.co.kr](http://www.boryungbio.co.kr)) 또는 소비자상담실(02-708-8085)에서 확인할 수 있습니다.

 ※이지드럭([ezdrug.mfds.go.kr](http://ezdrug.mfds.go.kr)) 의약품 정보를 참조하시기 바랍니다.

※올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사 또는 약사와 상담하십시오.

**제조사 :** (주)바이넥스 부산광역시 사하구 다대로 368-3

**제조외뢰자 :** (주)보령바이오파마 충청북도 진천군 광혜원면 사동길 2