

칼리다제 정

칼리다노게나제

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분: 칼리다노게나제(JP)..... 50 I.U
- 첨가제(타르색소): 황색5호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 첨가제(동물유래성분): 무수유당(소, 우유), 칼리다노게나제 (돼지, 돼장)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산, 스테아르산 마그네슘, 아크릴이소오렌지930630015, 오파드라이한색OY-S-7223, 전분글리콜산 나트륨, 포비돈K30, 폴리에틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상

주황색 원형의 장형성 필름코팅정

■ 효능·효과

1. 다음 질환에 의한 말초순환장애: 고혈압, 메니에르증후군, 폐색성혈전혈관염(버거병)
2. 갱년기장애, 망막락막의 순환장애에 의한 여러 증상의 개선

■ 용법·용량

1일 30~150 I.U를 3회 분할하여 경구투여 한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 뇌출혈 직후 등의 출혈 환자
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성 (galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증 (Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 부작용

- 1) 과민증: 때때로 발진, 두물거 가려움 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2) 순환기계: 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.

3) 소화기계: 때때로 위부불쾌감, 구역, 구토, 식욕부진, 상복부통, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다

4) 기타: 때때로 열감, 두물거 두통, 두중, 졸음, 권태감 등이 나타날 수 있다.

4. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의한다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

■ 사용기간

제조일로부터 24개월

■ 포장단위

30정/병, 500정/병

■ 제외의뢰자

(주)동구바이오제약, 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 18

■ 제조사

영풍제약(주), 인천광역시 남동구 함박외로 333

* 의약품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.

* 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서는 주의깊게 읽으시고 의약품과 함께 보관하십시오

* 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회에서 고시한 소비자분쟁 해결기준에 따라 교환 환불 받을 수 있습니다.

* 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

이 첨부문서의 작성일(2020년 07월 14일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)이나 소비자상담실(080-611-8690 수선자부담)로 문의하시어 확인하실 수 있습니다.