

자리오®겔

칼시포트리올일수화물 · 베타메타손디프로피오네이트

□원료약품 및 그 분량

1g 중 • 유효성분: 칼시포트리올입수화물(CP).....52.2μg(칼시포트리올무수물로서 50μg)
 베타메타손디프로피오네이트(USP).....0.643mg(베타메타손으로서 0.5mg)
 • 기타첨가제: 백색비셀린, 토크페를, 하이드로제네이티드 폴리데센

- 기타첨가제 : 백색바셀린, 토코페롤, 하이드로제네이티드 폴리데센

□성상

무색 내지 미백색의 거의 투명한 친유성겔제이다. 상부에 얇은 유층이 나타난다.

□효능·효과

성인 : 중등도~중증의 두피건선 및 두피 외 판상형 건선의 국소치료

□용법·용량

이 약은 1일 1회 한복에 적용한다. 두피에는 4주간, 두피 외 부위에는 8주간의 사용을 권장한다. 이 기간 후에는 의사의 감독 하에 반복적으로 사용할 수 있다. 하루 사용량은 15g을 넘지 말아야 하며, 한 주간 최대 사용량은 100g을 넘지 말아야 한다.

이 약에 함유된 칼시포트리올이 적용되는 체표면적은 30%를 넘어서는 안된다.

두피에 사용하는 경우, 환부 전체에 이 약을 사용한다.

보통 두피에는 하루에 1g에서 4g 사이의 양이면 충분하다. (4g은 1티스푼에 해당한다).

이 약은 얼굴이나 눈에 직접 사용해서는 안된다. 이상적인 효과를 얻기 위해, 이 약의 사용 후 바로 샤워를 하거나 머리를 감는 것을 권장하지 않는다.

이 약은 밤 또는 낮 시간대에 피부에 남아있어야 한다.

※ 플라스틱 병 사용시 : 이 약을 사용전에 병을 흔든다. 사용 후 손을 씻는다.

□사용상의 주의사항

1. 다음 한자어는 두어하길 맞 것.
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) 이 및 약 이 상토에 관련부 및 그 병역이 있는 한자 | 2) 갈대산 자정에 캄자 캄사르로써 영유기 개인 |
| 3) 물결의 앞쪽 간선, 후퇴상 간선, 비탈선 간선, 능곡선 간선 한자 | 4) 중음의 시작부분 전후 및 중음의 진행을 한자 |
| 5) 소아 | 6) 연약나 눈가 |
- 7) 과격하고 있는 술집성 의도등에 대한 처리방법의 차이점이 나타날 수 있다.
- 8) 코트코트코트에 합류로 안하여 음의 양과 강기
- | |
|--|
| (1) 세리니(세리니) 동등 동조전(다동조, 복등 동조)비바스(대방포진, 단포진) 4두, 종중종구기(정음, 서법면) 등성 파주강성 혼재장성(이학발) 수 있다. |
| (2) 상조 조조 정립부위 |
| (3) 평행(평행) 제2도 십제상 이상의 화상-중음(파지배한)의 위치에서 차이를 가져올 수 있다. |
| (4) 입문부위, 보물어, 장성안드르, 주사(roscace) 한자 |
| (5) 항로, 생기기 거려줄 줄라 |

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- [illegible]

2) 기타

- [illegible]

1) 전해지 오버요량을 잘 지킨다

- [illegible]

- 1) 2차 정검(성) 상면 형상에 따라 하위하, 감압 시 단계별로 코르티코스테로이드의 사용량을 조정한다.
- 2) 3차 코르티코스테로이드 치료 기간 간격을 늘린다. 3차 정검 시 발현된 증상 2개 또는 3개의 정검(발) 발발 여부를 확인한다. 치료 후에도 1회의 정검이 발발한다.
- 3) 1차부터, 스테로이드 치료 종료 후 6주 국소적 정검(발)이나 비특수 유도성 정검(발)을 실시한다. 국, 목, 목, 간발부위 정검(발)에 사용 시에는 증상의 정도를 충분히 고려한다.
- 4) 2차부터, 유도성 유도성 정검(발)을 감응성 정검(발) 발발, 발발 후 2주, 3주, 4주, 5주, 6주, 7주, 8주, 9주, 10주, 11주, 12주, 13주, 14주, 15주, 16주, 17주, 18주, 19주, 20주, 21주, 22주, 23주, 24주, 25주, 26주, 27주, 28주, 29주, 30주, 31주, 32주, 33주, 34주, 35주, 36주, 37주, 38주, 39주, 40주, 41주, 42주, 43주, 44주, 45주, 46주, 47주, 48주, 49주, 50주, 51주, 52주, 53주, 54주, 55주, 56주, 57주, 58주, 59주, 60주, 61주, 62주, 63주, 64주, 65주, 66주, 67주, 68주, 69주, 70주, 71주, 72주, 73주, 74주, 75주, 76주, 77주, 78주, 79주, 80주, 81주, 82주, 83주, 84주, 85주, 86주, 87주, 88주, 89주, 90주, 91주, 92주, 93주, 94주, 95주, 96주, 97주, 98주, 99주, 100주, 101주, 102주, 103주, 104주, 105주, 106주, 107주, 108주, 109주, 110주, 111주, 112주, 113주, 114주, 115주, 116주, 117주, 118주, 119주, 120주, 121주, 122주, 123주, 124주, 125주, 126주, 127주, 128주, 129주, 130주, 131주, 132주, 133주, 134주, 135주, 136주, 137주, 138주, 139주, 140주, 141주, 142주, 143주, 144주, 145주, 146주, 147주, 148주, 149주, 150주, 151주, 152주, 153주, 154주, 155주, 156주, 157주, 158주, 159주, 160주, 161주, 162주, 163주, 164주, 165주, 166주, 167주, 168주, 169주, 170주, 171주, 172주, 173주, 174주, 175주, 176주, 177주, 178주, 179주, 180주, 181주, 182주, 183주, 184주, 185주, 186주, 187주, 188주, 189주, 190주, 191주, 192주, 193주, 194주, 195주, 196주, 197주, 198주, 199주, 200주, 201주, 202주, 203주, 204주, 205주, 206주, 207주, 208주, 209주, 210주, 211주, 212주, 213주, 214주, 215주, 216주, 217주, 218주, 219주, 220주, 221주, 222주, 223주, 224주, 225주, 226주, 227주, 228주, 229주, 230주, 231주, 232주, 233주, 234주, 235주, 236주, 237주, 238주, 239주, 240주, 241주, 242주, 243주, 244주, 245주, 246주, 247주, 248주, 249주, 250주, 251주, 252주, 253주, 254주, 255주, 256주, 257주, 258주, 259주, 260주, 261주, 262주, 263주, 264주, 265주, 266주, 267주, 268주, 269주, 270주, 271주, 272주, 273주, 274주, 275주, 276주, 277주, 278주, 279주, 280주, 281주, 282주, 283주, 284주, 285주, 286주, 287주, 288주, 289주, 290주, 291주, 292주, 293주, 294주, 295주, 296주, 297주, 298주, 299주, 300주, 301주, 302주, 303주, 304주, 305주, 306주, 307주, 308주, 309주, 310주, 311주, 312주, 313주, 314주, 315주, 316주, 317주, 318주, 319주, 320주, 321주, 322주, 323주, 324주, 325주, 326주, 327주, 328주, 329주, 330주, 331주, 332주, 333주, 334주, 335주, 336주, 337주, 338주, 339주, 340주, 341주, 342주, 343주, 344주, 345주, 346주, 347주, 348주, 349주, 350주, 351주, 352주, 353주, 354주, 355주, 356주, 357주, 358주, 359주, 360주, 361주, 362주, 363주, 364주, 365주, 366주, 367주, 368주, 369주, 370주, 371주, 372주, 373주, 374주, 375주, 376주, 377주, 378주, 379주, 380주, 381주, 382주, 383주, 384주, 385주, 386주, 387주, 388주, 389주, 390주, 391주, 392주, 393주, 394주, 395주, 396주, 397주, 398주, 399주, 400주, 401주, 402주, 403주, 404주, 405주, 406주, 407주, 408주, 409주, 410주, 411주, 412주, 413주, 414주, 415주, 416주, 417주, 418주, 419주, 420주, 421주, 422주, 423주, 424주, 425주, 426주, 427주, 428주, 429주, 430주, 431주, 432주, 433주, 434주, 435주, 436주, 437주, 438주, 439주, 440주, 441주, 442주, 443주, 444주, 445주, 446주, 447주, 448주, 449주, 450주, 451주, 452주, 453주, 454주, 455주, 456주, 457주, 458주, 459주, 460주, 461주, 462주, 463주, 464주, 465주, 466주, 467주, 468주, 469주, 470주, 471주, 472주, 473주, 474주, 475주, 476주, 477주, 478주, 479주, 480주, 481주, 482주, 483주, 484주, 485주, 486주, 487주, 488주, 489주, 490주, 491주, 492주, 493주, 494주, 495주, 496주, 497주, 498주, 499주, 500주, 501주, 502주, 503주, 504주, 505주, 506주, 507주, 508주, 509주, 510주, 511주, 512주, 513주, 514주, 515주, 516주, 517주, 518주, 519주, 520주, 521주, 522주, 523주, 524주, 525주, 526주, 527주, 528주, 529주, 530주, 531주, 532주, 533주, 534주, 535주, 536주, 537주, 538주, 539주, 540주, 541주, 542주, 543주, 544주, 545주, 546주, 547주, 548주, 549주, 550주, 551주, 552주, 553주, 554주, 555주, 556주, 557주, 558주, 559주, 560주, 561주, 562주, 563주, 564주, 565주, 566주, 567주, 568주, 569주, 570주, 571주, 572주, 573주, 574주, 575주, 576주, 577주, 578주, 579주, 580주, 581주, 582주, 583주, 584주, 585주, 586주, 587주, 588주, 589주, 590주, 591주, 592주, 593주, 594주, 595주, 596주, 597주, 598주, 599주, 600주, 601주, 602주, 603주, 604주, 605주, 606주, 607주, 608주, 609주, 610주, 611주, 612주, 613주, 614주, 615주, 616주, 617주, 618주, 619주, 620주, 621주, 622주, 623주, 624주, 625주, 626주, 627주, 628주, 629주, 630주, 631주, 632주, 633주, 634주, 635주, 636주, 637주, 638주, 639주, 640주, 641주, 642주, 643주, 644주, 645주, 646주, 647주, 648주, 649주, 650주, 651주, 652주, 653주, 654주, 655주, 656주, 657주, 658주, 659주, 660주, 661주, 662주, 663주, 664주, 665

5. 상호작용

- [illegible]

6) 다중=이차

7. 소비자 관련 투자: 이익 18%에 10%의 위험비율에 대한 안전성 및 유동성이 연구되지 않더라도(다소)의 경우 중등에 대한 비표 표현비의 비율이 높으므로 이익의 감소 추세 및 위험성이 적지 않음(비판의 여지 있음)
 8. 공평하게 대우 여부: 일반소비자도 공평하게 대우 시 이상행위가 나타날 수 있으므로 대당 또는 37만 건을 범행범위 부위에 일괄성을 사용하는 경우 무리하지 않다.
 9. 공평하게 이익 처치
 - 가) 이익을 공평하게 사용하는 경우 불충당성이 상충할 수 있으나, 투자를 중단하면 정상이 회복한다. 다중, 판매, 근무시간, 직원, 총액 등의 과다집중현상이 나타날 수 있다.
 - 나) 공소 코리크로노메트릭을 가져오므로 공평하게 해는 경우, 노동시간 및 생산능력이 하락하여 일반소비자도 가격적인 이차부담(노동부담을 일괄)할 수 있다. 이러한 경우 대응요청할 실익이 없다.
 - 다) 코리크로노메트릭과 관련된 만능투성이 나이지는 경우, 코리크로노메트릭을 참조하여야 한다.
 - 4) 광범위한 총액 배분: 이익은 19%에 위험비율이 이익을 초과하여 소비자가 보고하였는데, 주당 이익 약 240을 5개월동안 사용하였고(1월 총액 운영량 약 159 인당 약 34을 사용) 그 결과 치료 도중 극중 중증군을 경험했다. 이 행사가 치료를 갑자기 중단한 후 중증군 선전이 보고 되었다.(연구자료 포함)
4. 적성상 이유
- 1) 인공적으로 사용하지 않는다. 민첩이 들어 올리는 경우는 적절 불로 된다. 중상시 심할 경우는 인공의사의 치료로 받는다.
 - 2) 화상이나 연도 등 지면의 영향을 최소화하여 사용한다.

3) 의사

3. 3차로이전 제2차로이전 30%를 초과하지 않는다(1월 1일 기준)(15%를 초과하면 급속도로 불충분할 수 있다).
- 4) 이익 약 4억 유로 손실 및 3차로이전에는 어떤 영향도 없거나 무시할 만하다.
11. 보편 및 특정성 유지(보편성)
- 1) 어린이의 나이 및 성별에 관계 없이 보편한다. 2) 개형 3차로이전(개별-비), 6차로이전(개별-아일랜드), 12차로이전(개조)에 대해 사용한다. 3) 변경은 반드시 필요하다.
12. 기타
- 1) 마우르셔스 캄프스트랄의 국외 사용에 대해 수평 및 수직 발병성 실험 및 테스트에서 장구 투여시의 발병성 실험 결과 사례에서의 특별한 위험은 나타나지 않았다.
- 2) 마우르셔스 캄프스트랄의 수직 발병성 실험 결과 캄프스트랄이 비파괴적으로 유산(15%)을 통해 전파될 수 있음이 입증되었다.
- 3) 마우르셔스 캄프스트랄에 대한 실험 결과 국외 사용에 대해 수평 및 수직 발병성 실험 결과 사례에서의 특별한 위험은 나타나지 않았다. 비파괴적으로 캄프스트랄에 대해 실험할 가능성은 수평 및 수직 발병성 실험 결과 사례에서의 특별한 위험은 나타나지 않았다.
- 4) 토끼에서 국외 사용 실험 결과, 이 약은 강제로 중독되는 부위 자극 및 기침, 기침 자극의 지사의 투여가 되었다.

□포집

50g/병

□저장

차광한 기밀용기

□ **최브문서** 시행

2020. 05. 21 • 이 첨부문서 시행일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.in-shinyak.co.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

□ **교학 및 제품**

- * 본 약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약 구입시 사용(인)에 문제가 없거나, 변질 또는 오손의 제품 등은 약국 등의 개입없이 한하여 교환하여 드립니다.
또한 제품에 관하여 문의사항이 있으시면 연락주시요. 연락처 : 고객지원팀 1588-4675 / 080-090-6777 (주시간대)
- * 본 약제 무역 또는 복용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국약물안전센터(1644-6223)로 문의 및 보고하여 주시고, 동일발자에 의약품 부작용 때마침내
신고를 하십시오.