

효과 빠른 정상 지사제

베로나에스 (정)

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 02370(정장제)

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

원료약품의 분량 : 1정(370mg) 중

▶ 유효성분

현 초 가 루(성규) 66.7 mg

베르베린염화물수화물(KP) 36.7 mg

아크리놀수화물(KP) 13.3 mg

▶ 동물유래성분(유당수화물/소/우유)

▶ 첨가제(타르색소) : 황색5호

▶ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 신화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 이산화규소, 젤라틴, 카르나우비닌, 폴리메틸렌글리콜400, 피마자유, 히프롤로오스2910

성 상 : 황색의 원형 필름코팅정제

효능 · 효과 : 설사, 체한, 붉은변, 토사

용법 · 용량 : 만 15세 이상 : 1회 2정

만 8세 이상~만 15세 미만 : 1회 1정

1일 3회, 복용간격 4시간 이상을 두고 복용할 것.

사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아

2) 만 7세 이하의 어린이

3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.

1) 발열을 수반하는 설사 환자, 고열자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자

2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3) 이 약은 황색 5호(신셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용(사용) 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜십시오.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 투여하십시오.

3) 1주 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.(사용 후 반드시 밀폐 보관하십시오.)

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

사용(유효)기간 : 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만일 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의하시거나 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd. 한국 한솔은 공채를 채용하고
국내외로 약 30-35

첨부문서 개정 년월일 2019. 06. 26

HS : 060509