

일반 의약품
분류번호 : 02310

잇몸질환 종합치료제



텐다나 Tendanamin cap.
민캡슐



【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

리소짐염산염(KP)	30.0 mg
아스코르브산(KP)	150.0 mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP) (토코페롤아세테이트로 5.0 IU)	10.0 mg
카르바조크롬(KP)	2.0 mg

부형제 : 옥수수전분
붕해제 : 크로스카르멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 라우릴황산나트륨
활택제 : 스테아르산마그네슘
첨가제(타르색소) : 적색3호, 청색1호

【성상】 주황색 분말이 든 상부 보라색, 하부 흰색의 경질 캡슐제

【효능·효과】 치주(치아주위조직)치료후 치은염(잇몸염), 경·중등도 치주(치아주위조직)염의 보조치료

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
15세 미만의 소아
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 다른 약물을 복용하고 있는 환자
 - 지금까지 약이나 달걀에 알레르기 증상 (예를 들면, 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 - 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것
 - 이 약 복용 후 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염(입안염) 등이 나타난 경우
 - 피부 : 피부점막안증후군(스티븐스-존슨 증후군), 독성표피괴사용해(리엘증후군)가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반(붉은 반점), 가려움, 안충혈, 구내염(입안염) 등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우
 - 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 장기간 계속하여 사용하지 말 것
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【포장단위】 120캡슐, 240캡슐

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본 제품은 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하시기 바랍니다.
※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하시거나 화일약품(주) (02-564-2722)로 문의하시기 바랍니다.
※ 제조의뢰자 : 화일약품(주) 경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 156
※ 제조자 : 우리들제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50

제조사

 **우리들제약 (주)**
www.wooridulpharm.com
(소비자상담실) 080-080-4211

제조의뢰자

hwaill 화일약품 (주)

작성년월일 : 2015년 02월 10일
개정년월일 : 2016년 09월 22일

TNC1609.03
CA-16-09