

근육경련 - 혈액순환 개선제

마그포스

연질캡슐

신경비타민 함유

[일반의약품]

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를
주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



【원료약품 및 그 분량】 1연질캡슐 중

산화마그네슘(KP)(마그네슘으로서 150mg).....	250.0mg
토코페롤아세테이트(KP)(비타민E로서 500IU).....	500.0mg
γ-오리자놀(KP).....	10.0mg
피리독신염산염(KP).....	50.0mg
티아민질산염(KP).....	50.0mg

첨가제(타르색소): 적색 40호, 황색 5호, 청색 1호

동물유래성분: 젤라틴(소, 가축), 숙신산젤라틴(소, 가축)

【성상】 회백색의 유상물질이 들어있는 적갈색의 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로

- 임신 · 수유기

- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

- 노년기

- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

· 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화: 어깨 · 목결림, 수족저림 · 수족냉증(손발이 차가움)

· 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

· 각기

· 눈의피로

2. 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인: 1회 1캡슐, 1일 2회 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

(1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

(2) 만 12개월 미만의 젖먹이

(3) 심한 증상의 신부전 환자

(4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자

(5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

(1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 황장(이차)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

(2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

(1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

(2) 레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오).

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (3) 심장순환기계기능 장애 환자
- (4) 신장(콩팥)장애 환자
- (5) 저단백혈증 환자
- (6) 임부

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지하십시오.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(종혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- (4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- (5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- (6) 항일도스데론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- (7) 우발적으로 과량복용한 경우
- (8) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 일반적 주의

- (1) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- (2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피하십시오.

8. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

[사용기한] 외부 포장에 표시된 사용기한내에 사용하십시오.

[포장단위] 60연질캡슐, 120연질캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2015년 3월 2일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL : 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조외도자 · 판매원 : 코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로18번길 45

제조자 : 한국프라임제약(주) 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

☼ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

최초 작성연월일 : 20150302