



제품명 케어컨 캡슐 단상자

날짜 2025.05.22

Size 136 X180mm

담당자 콘텐츠제작팀 차재현 주임(01056197828)

인쇄사양 4도 + 무광



전체적인 사이즈 및 문안 확인 부탁드립니다.

절취부분 위치 및 바코드 표시기재 위치 확인 부탁드립니다.

온약

일반의약품

KGMP적격업소

10캡슐

케어컨

캡슐

당귀수산

타박상

붓기

통증

케어컨

당귀수산

※ 소비자 상담실 : 031-642-0711 ※ 홈페이지 : <http://www.kyungjinpharm.co.kr> ※ 본 의약품에 대한 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 본 의약품은 순수 생약제제로서 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여드립니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

일반의약품 정보	개정일 : 2025년 05월 22일
이 약을 사용하기 전 반드시 첨부문서를 확인하십시오.	
[유효성분] 1캡슐 중(597 mg 중) 당귀(KP) 0.63 g, 작약(KP) 0.42 g, 오약(KP) 0.42 g, 향부재(KP) 0.42 g, 소목(KP) 0.42 g, 홍화(KP) 0.33 g, 도인(KP) 0.29 g, 계심(성규) 0.25 g, 감초(KP) 0.21 g, 이상 건조엑스로서 350 mg ■ 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유) ■ 첨가제(타르색소) : 캡슐(황색 203호, 청색 1호, 적색 40호) ■ 기타첨가제 : 옥수수전분, 스테아르산나트륨	
[성상] 회갈색의 가루가 충전된 상부 갈색, 하부 흰색의 캡슐제	
[효능·효과] 타박상으로 인한 부은 것 및 통증	
[용법·용량] 보통 성인 1회 3캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간(식사 때와 식사 때 사이)에 복용한다.	
[사용상의 주의사항] 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에 함유되어 있는 홍화, 도인에 의해 유조산의 위험이 있다) 2) 이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 1) 고혈압 환자 2) 심장에 또는 신장에 환자 3) 부종 환자 4) 고령자(일반적으로 고령자는 생리	

기능이 저하 되어 있으므로 감행하는 등 주의할 것.) 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등이 나타날 수 있다.) 7) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
상당시 가능한 이첨부문서를 소할 것.
1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 ① 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(일 최대 배합량이 건조로서 1 g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관혈(혈청칼륨치)의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것) ② 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관혈을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. ③ 피부 : 발진, 발적, 가려움 등 ④ 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 절골합유제, 건조합유제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유 제제, 루프계 이뇨제, 루로세미드, 에타크리산 또는 치아지드계 이뇨제, 테트라클로로메타이아이드와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타날 수 있으므로 신중히 복용할 것. 3) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품용 병에 봉지되어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

일반의약품 정보(계속됨)	분류번호 : 219	[제품명] 케어컨캡슐(당귀수산)
[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관		[제조자] 경진제약(주) 경기도 고양시 일산서구 406면 6
[사용기한] 용기 측면 표시일까지		[판매처] 온비타민(주) 전라남도 담양군 담양읍 예곡길 61 8