

고함량 콘드로이틴설페이트나트륨 600mg
+ 비타민B 복합체

비타콘틴 600 정

[일반의약품]

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



● 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

감마오리자놀(KP)	5mg
푸르셀티아민(KP)	60mg
니코틴산아미드(KP)	60mg
콜린타르타르산염(USP)	20mg
판토텐산칼슘(KP)	15mg (칼슘으로서 1.2mg)
리보플라빈부티레이트(KP)	6mg
이노시톨(KP)	20mg
콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	600mg
피리독신염산염(KP)	25mg
시아노코발라민1000배산(KP)	20mg (시아노코발라민으로서 20μg)

첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

● 성상 : 갈색의 장방형 필름코팅정

● 효능 · 효과

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆ 의 보급
- 육체피로, 임신수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안
이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같
습니다.
- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통,
어깨결림 등)
- 각기 -노의 피로

● 용법 · 용량

만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 식후 복용

● 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉

으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis :

원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 신장결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불
내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결
핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토
오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)
등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면
안 됩니다.

- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십
시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제,
제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에
의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저나트륨혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여 중인 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사,
치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이
첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕
부진, 복부팽만감, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름,

심박동불규칙, 피부발진, 어지러움, 얼굴다리 중창(부기)

- 2) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 6) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
- 7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 8) 우발적으로 과량복용한 경우
- 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
- 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용 전후에는 피하십시오.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

● **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● **사용기한** : 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.

● **포장단위** : 45정, 90정

● **소비자상담** : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일(2015년 3월 5일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolon-pharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관 (<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조의뢰자 · 판매원 : 코오롱제약(주)

대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조사 : ㈜마더스제약

경상북도 경산시 진량읍 공단6로24길 18

최초 작성연월일 : 20150305

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45