

고함량 은행잎 추출물 120mg 함유,
혈액순환 장애 개선제

빙빙정 (은행엽엑스)



【일반의약품】

※ 이 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고,
첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.



● 원료약품 및 그 분량 : 1정(295.6mg) 중

은행엽엑스(생규)120.0mg

(총강고플라본배당체로서 28.8mg)

유당수화물(기원 : 소, 사용부위 : 우유)

첨가제(타르색소) : 청색 1호 알루미늄 레이크, 황색 203호 알루미늄 레이크

● 성상 : 녹색의 원형 필름코팅정

● 효능 · 효과

1. 주 효능효과

- 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료
- 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)
- 3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

● 용법 · 용량

1. 성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽엑스로서 1회 40mg, 1일 3회 또는 1회 80mg, 1일 2회 경구 투여(복용)합니다.
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg, 1일 3회 또는 1회 120mg, 1일 2회 경구 투여(복용)합니다.

2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감합니다.

● 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 이 약에 과민증 환자
- 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 부작용

- 1) 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있습니다.
- 2) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 어지러움
- 가려움증

3. 일반적 주의

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

4. 임부에 대한 투여

동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적습니다.

5. 소아에 대한 투여

소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관합니다.

- **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
- **사용기한** : 외부 포장에 표시된 사용기한 내에 사용하십시오.
- **포장단위** : 120정, 240정
- **소비자상담** : 080-203-6000 (수신자 요금부담)

※본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※첨부문서 작성일(2015년 5월 15일) 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실(TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.

※의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>) '의약품검색'란을 참조하세요.

제조의회사·판매원:코오롱제약(주) 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45

제조자:일리코제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길21

최초 작성연월일 : 20150225

최종 개정연월일 : 20150515

❖ 코오롱제약주식회사

공장 : 대전광역시 대덕구 문평서로 18번길 45