클래드® 정 500mg
TS1154-90221

전문의약품 분류번호 : 619 기타의 항생물질제제(복합항생물질제제를 포함)

클래드® 정 500mg

CLAD® Tabs.
(Clarithromycin)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
- 유효성분 : 클래리스로마이신(KP) ..... 500mg(역가)
- 첨가제(타르색소) : 적색40호알루미늄레이크, 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 오파드라이옐로우(85G42072), 오파드라이클리어(OY-C-7000A), 콜로이드성이산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 탈크, 포비돈, 푸마르산스테아릴나트륨

【성 상】 노란색의 타원형 필름코팅정

【효능 · 효과】
○ 유효균종
황색포도구균, 폐렴연쇄구균, 스트렙토코쿠스 피오게네스(그룹 A-베타용혈성), 리스테리아 모노사이토제네스, 스트렙토코쿠스 아갈락티애(그룹 B), 스트렙토코쿠스 비리단스, 인플루엔자균, 파라인플루엔자균, 모락셀라 카타랄리스, 레지오넬라 뉴모필라, 보르데텔라 백일해, 캄필로박터, 헬리코박터 파이로리, 임균, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 펩토코커스 니이거, 프로피오니박테리움 아크네, 박테로이데스 멜라니노게니쿠스, 마이코박테리움 아비움, 마이코박테리움 인트라셀룰라
○ 적응증
- 하기도 감염증 : 기관지염, 폐렴 등
- 상기도 감염증 : 인두염, 부비동염 등
- 피부 및 피부조직 감염증
- 마이코박테리움 아비움, 마이코박테리움 인트라셀룰라에 기인한 마이코박테리아 감염증
- 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸

【용법 · 용량】
○ 성인
: 클래리스로마이신으로서 보통 1회 250mg(역가) 1일 2회 투여하며, 중증 감염증의 경우에는 1회 500mg(역가) 1일 2회 투여한다. 투여기간은 보통 7~14일이다. 크레아티닌청소율이 30mL/min 이하인 신부전 환자의 경우에는 용량을 절반으로 줄여야 한다.
즉 1일 1회 250mg(역가), 중증 감염증의 경우에는 1회 250mg(역가) 1일 2회 투여한다. 이런 환자에게는 14일 이상 투여하지 않는다.
○ 마이코박테리아 감염증
: 이 약으로서 1회 500mg(역가) 1일 2회 투여한다. 이 경우 에탐부톨, 클로파지민, 리팜핀과 같은 다른 항마이코박테리아제의 병용투여 하여야 한다.
○ 십이지장궤양 환자의 헬리코박터 파일로리 박멸
: 14일간 이 약으로서 500mg(역가) 1일 3회와 오메프라졸 40mg 1일 1회 병용투여하고, 연속하여 14일간 오메프라졸 40mg 1일 1회 투여한다. 즉, 클래리스로마이신은 1회 500mg(역가) 1일 3회 14일간(1~14일)투여하고, 오메프라졸을 1일 1회 40mg을 28일간(1~28일)투여한다.
○ 12세 이상의 소아는 성인과 동일, 12세 미만 소아는 클래리스로마이신 건조시럽을 사용한다.

[illegible]

11. 적용상의 주의
정상인대상으로 약물동태시험에서 산연구산할루디늄과 병용하는 경우 이 약의 흡수가 저하된다는 보고가 있다.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(15~30℃)보관

【포장단위】 28정/병

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

* 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
* 제품에 대한 기타 자세한 사항과 이후 변경된 내용은 본사 의약정보부(02-595-6103)로 문의하시기 바랍니다.
* 부작용 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

TS1154-90221
작성년월일 : 2019년 2월 21일

제조자
한국유나이티드제약 (주)
세종특별자치시 전동면 노장공단길 25-23

제조의뢰자
한국바이오켐제약 (주)
세종특별자치시 전동면 전의면 산단길 204